Фази розвитку та основні елементи технології вирощування ярого ріпаку

Фази розвитку

Весна | Літо

Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень



0–9	10–19	20-26	30–39	50–59	60–69	70–79	80–89
Проростання	Сходи	Утворення листків та розетки	Стеблування	Утворення бутонів (бутонізація)	Цвітіння	Утворення стручків	Дозрівання

Добрива

Перше підживлення **азотом** (N) в передпосівну культивацію 60–80 кг/га (д.р.), або повна доза**

Сірка (S) 20–30 кг/га (д.р.) перед висівом*

Фосфор: 50–60 кг/га
Калій: 100–160 кг/га
Перед основним обробітком ґрунту

Друге весняне підживлення **азотом** (N) 40 кг/га (д.р.)**

Бор (B) 150–300 г/га як листкове підживлення, можливо в комбінації із ЗЗР

ВАЖЛИВО!!!
Для врожаю ріпак потребує (в д.р):
(азоту) N = 5–6 кг на 1 ц врожаю
(сірки) S = 1 кг на 1 ц врожаю

* В разі неможливості внесення перед висівом позитивно впливає внесення сірковмісних листкових добрив в фазу стеблування.
** Друге підживлення азотними добривами ефективне за наявності вологи в ґрунті. За прогнозованих посух доцільно внести повну дозу азотних добрив в перше підживлення перед висівом.

Регуляція росту

Росторегуляція та контроль основних хвороб за висоти рослин 15–25 см

Захист рослин від шкідників

Хрестоцвіті та інші види блішок
Ріпаковий квіткоїд
Капустяний стручковий прихованохоботник
Капустяний стручковий комарик
Попелиці

Поява шкідника
Захист рослин від шкідників
Протруєння насіння

Захист рослин від хвороб

Пероноспороз
Фомоз, борошниста роса
Склеротиніоз, альтернаріоз

Поява хвороби
Захист рослин від хвороб