

2026

Каталог насіння

КУКУРУДЗА ТА СОНЯШНИК

ЗАВЖДИ
ПОРУЧ
З ВАМИ



www.cropscience.bayer.ua





СОНЯШНИК



КУКУРУДЗА



ACCELERON®



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ



CLIMATE FIELDVIEW™



КОМАНДА

Зміст

Портфоліо соняшнику.....	6
Портфоліо кукурудзи.....	30
Боротьба з підробками.....	40
Рішення Acceleron® та Йоало®	106
Системи захисту	112
Climate FieldView™	116
Регіональна команда	122
Застереження та рекомендації	131

Уся інформація стосовно продуктів компанії ТОВ «Байер», що надається компанією або її співробітниками чи агентами в усній або письмовій формі, включно з інформацією, що міститься в цьому каталозі, надається сумлінно, проте вона не є гарантією компанії ТОВ «Байер» щодо результатів використання або придатності цих продуктів, адже ці результати можуть залежати від місцевих кліматичних умов та інших чинників. ТОВ «Байер» не несе відповідальності за жодну таку інформацію. Ця інформація не вказується в жодному контракті з компанією ТОВ «Байер», якщо інше не зазначено в письмовій формі.

ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ!

Висловлюємо кожному з вас свою повагу та вдячність за плідну співпрацю з брендом DEKALB®!

Завдяки вашій стійкості сільське господарство продовжує розвиватися та підтримувати не тільки економіку України, але й глобальну стабільність у виробництві та забезпеченні продовольством населення Землі.

Ми віримо, що сільськогосподарський сезон 2026 року принесе врожаї високої якості зі стабільними цінами на с.-г. продукцію та стабільним функціонуванням логістичних шляхів для безперебійного постачання аграрної продукції до тих країн, які її потребують.



Будь-яка справа в рослинництві починається з якісного насіння, тож до сезону 2026 року ми підготували портфоліо гібридів кукурудзи та соняшнику, що містить уже відомі гібриди, які стабільно підтверджують свою продуктивність протягом свого існування на ринку. Також ми готові представити серію новинок, які формують ще кращі результати, оскільки прогрес у селекції із поєднанням господарсько-цінних характеристик, комплексу стійкості до біотичних й абіотичних факторів неодмінно зумовлює новий рівень продуктивності.

Хочемо зауважити, що оригінальне насіння бренду DEKALB® доступне тільки в оригінальних синіх мішках, додатково захищених системою перевірки Cap Seal. Компанія «Байер» не замовляє перетруєння чи будь-яку іншу додаткову обробку насіння, що призводить до його перепакування. Саме на насіння в оригінальній упаковці, придбане в наших офіційних дистриб'юторів та протруєне інноваційною комбінацією Acceleron® Elite, поширюється гарантія виробника, технічна підтримка професійної команди «Байер» та отримання очікуваного результату — високого врожаю відповідної якості.

На шляху реалізації місії «Байер» — «Світ без хвороб і голоду» (Health for all, Hunger for none) ми прагнемо співпрацювати з вами якнайтісніше, аби разом змінювати на краще майбутнє сільського господарства у світі та Україні зокрема.

Щиро бажаємо вам успішного сезону, високих урожаїв та задоволення від результатів!

Лаерсіо Бортоліні, керівник Аграрного підрозділу
Польщі, Чехії/Словаччини, Балтійських країн та України

Анна Громаковська, керівник Аграрного підрозділу
з операційних питань в Україні

ЗАВЖДИ ПОРУЧ З ВАМИ!

*Поки ви розпочинаєте новий сезон,
ми створюємо майбутні перспективи*

*Ми вкладаємо значні ресурси в постійне
вдосконалення якості нашої продукції та
розробку нових рішень. Такий підхід дає нам
зможу забезпечувати максимально прибутковий
і стійкий спосіб ведення сільського господарства.*



Понад
260 млн €
інвестицій
у будівництво
заводу



Демонстраційні
дослідження
5
Байєр АгроАрен



Понад
700
працівників



Експорт насіння
в країни
ЄС

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ





Зміст

Стадії розвитку соняшнику	8
Загальні відомості	10
Суппортер СУ НОВИНКА	12
Базалльт НОВИНКА	14
Мегаполіс КЛП НОВИНКА	16
Вівальто НОВИНКА	18
Гудзон	20
Бельведер	22
Еленіс	24
1018 Л КЛП	26
Людмила	28



СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОНЯШНИКУ



СІВБА	VE	V1-VN	R1	R3
Проростання Насіння поглинає вологу (від 97 до 240% від маси залежно від гібрида), набубнявіє, з'являється корінець, з'являється гіпокотиль із сім'ядолями	Поява сходів Сім'ядолі з'являються на поверхні. Перші справжні листки менше 4 см у довжину	Розвиток листків Підраховують лише ті листки, які більше 4 см у довжину. Кількість листків є сортовою ознакою й може коливатися від 23 до 36	Стадія «зірочки» На поверхні пагону утворюється квітковий бутон розміром з монету 5 коп., який нагадує зірочку з променями. Починається стрімкий ріст стебла в довжину	Квітковий бутон Незрілий бутон витягується більше 2 см над найближчим листям. Продовжується ріст стебла та листків

КОД ВВСН

00-08	09	12-39	51	52-58
-------	----	-------	----	-------

ДНІ ПІСЛЯ СІВБИ

0	10		48	67
---	----	--	----	----



R4	R5.1–5.5	R5.9	R6–R7	R8–R9
Початок розкриття кошика По периметру суцвіття добре помітні язичкові квітки, які мають жовте забарвлення	Початок — середина цвітіння Залежно від відсотка розкритих трубчастих квіток розподіляється на проміжні стадії: R5.1 — 10% R5.3 — 30% R5.5 — 50% Завершується ріст стебла	Кінець цвітіння Добігає кінця процес запліднення квіток. Завершується формування листків. Рослина починає поглинати багато води	Утворення та розвиток насіння Язичкові квітки осипаються. Розпочинаються процеси утворення, наливу насіння та процеси синтезу олії. Найбільш критичний період формування врожаю та його якості	Фізіологічна і технічна стиглість Кошик набуває жовтого, а потім коричневого забарвлення. Налив насіння припиняється. Іде втрата вологи. Вологість насіння знижується із 40 до 10–12%
КОД ВВСН				
59	60–65	69	71–79	81–89
ДНІ ПІСЛЯ СІВБИ				
71	73–77	83	84–86	104–119

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Формула врожайності

Урожай — це результат поєднання цілої низки важливих компонентів, як-от стан ґрунту, генетичний потенціал насіння, волога, живлення, погодні умови, захист у період вегетації, рістрегуляція та інше. Але скільки б їх не було, усі вони впливають усього на дві складові — це кількість зерна та його якість (виповненість, вага, олійність, білок, цукор тощо).

Кількість насінин

Для соняшнику цей показник напряму залежить від кількості рослин (кошиків) на гектарі й формується в період від сівби до стадії V2 та багато в чому залежить від якості сівби і захисту сходів. Кількість насіння на одній рослині визначатиметься кількістю закладених у кошику квіток. Кількість зачатків квіток визначається на стадіях V6–R1. Однак не всі зачатки будуть фертильними, тобто здатними запилитися й сформувати повноцінне насіння. Як правило, рослина «перестраховується» і закладає більшу кількість квіток, ніж надалі може забезпечити.

З кількістю фертильних квіток рослина визначається пізніше, на стадіях R1–R4. Тут вирішальне значення матиме достатнє надходження в рослину необхідних елементів


живлення, а також інтенсивність фотосинтезу. Соняшник — культура перехресного запилення, і для запилення максимальної кількості квіток необхідне дотримання двох умов: наявність достатньої кількості запилювачів та прийнятна погода (сонце, слабкий вітер і незначні опади). Якщо ці умови не виконуються, то не всім фертильним квіткам судилося стати насінням.

Маса тисячі насінин


Друга важлива складова врожаю — маса насіння. Формується вона після цвітіння — стадії R6–R8. Тут визначальним фактором буде достатня кількість фосфору та калію, які рослина отримує як із ґрунту, так і завдяки реутилізації з інших частин рослини. Власне, для вільного руху елементів рослиною потрібен достатній рівень забезпечення рослини водою. Приблизно в цей же час відбувається формування якості врожаю — вміст олії в насінні.

Таким чином, вегетаційний період соняшнику можна умовно розбити на два етапи: перший — це формування врожаю, який триває від сівби до цвітіння, другий — етап збереження врожаю від цвітіння до закінчення наливу насіння. Найкритичнішим на етапі формування врожаю соняшнику є період R1–R4, оскільки саме в цей час визначається кількість фертильних

Етапи формування та збереження врожаю



Склад різновидів продовольчого жиру та олії



квіток або потенційна кількість насіння. На етапі збереження врожаю найважливішою є фаза R6–R8. Саме в цей період відбувається утворення мезофілу сім'ядоль — тканини, що запасає жирні кислоти, тобто фактично формується рівень олійності насіння. Нестача вологи та інші негативні фактори пригнічують ріст і розвиток насіння всіх зон кошика.

Забезпечення оптимальних умов у ключові фази розвитку дасть змогу рослині використати весь закладений у неї потенціал та сформувати справді високий і якісний урожай.

Олія

З давніх часів соняшник зачаровував людей своєю красою, тому й вирощували його спочатку як квітку, потім як лікарську рослину, згодом олію соняшнику почали використовувати в технічних цілях. І тільки починаючи з XIX сторіччя соняшникова олія стала займати своє почесне місце на кухонних полицях у різних країнах по всьому світу.

Наразі надзвичайну популярність набирає здорове харчування, і тому рослинні олії знову потрапляють у фокус уваги людства.

Порівняння характеристик найпопулярніших рослинних олій вказує на винятковий склад соняшникової олії, яка є лідером за вмістом корисних ненасичених кислот.

За даними FEDIOL (європейської асоціації виробників рослинної олії та протеїнового борошна), соняшникова олія містить близько 89% ненасичених кислот, корисних для споживання людиною. За цим показником вона поступається лише одній — ріпаковій.

Дедалі більшу популярність набирають гібриди соняшнику з високим вмістом олеїнових кислот, так звані високоолеїнові гібриди. Загальний вміст ненасичених кислот в олії таких гібридів доходить до 95%, це безсумнівно підіймає популярність соняшникової олії та підвищує її попит на світовому ринку. Разом із покращенням якісних показників олії не припиняється селекційна робота над пошуками гібридів із підвищеною загальною часткою олії. Ще кілька десятиріччя тому досить високим рівнем олійності була частка в 40%, на сьогодні цей показник у деяких гібридів перевищує 50%, а це означає, що за тієї самої врожайності вихід олії підвищився приблизно на чверть.

Однією з переваг гібридів соняшнику від компанії «Байєр» є саме висока олійність. За середнього рівня закупівельного базису в 46%, більш високий відсоток олійності буде відчутно підвищувати загальну прибутковість гібрида.

НОВИНКА

СУППОРТЕР СУ

Високоврожайний лінолевий гібрид
під технологію ExpressSun®Тип гібрида: **інтенсивного типу**Група стиглості: **пізньостиглий, 116–120 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз

6 7 8 **9**Біла гниль
прикоренева6 7 **8** 9

Вугільна гниль

6 7 **8** 9

Іржа

6 7 8 **9**Несправжня
борошниста роса6 **7** 8 9

Фомопсис

6 **7** 8 9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6 7 **8** 9

Стійкість до вилягання

6 **7** 8 9

Запилення

6 7 8 **9**

Вміст олії

6 7 **8** 9

Посуhostійкість

6 7 **8** 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в умовах вирощування за інтенсивною технологією
- Висока стійкість до посушливих умов

ЗАГАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИСтійкість до вовчка: **раси А–G**Вміст олії: **на рівні 46–50%**Висота рослини: **вище за середню**Нахил кошика: **напівнахилений**Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Добра стійкість до посухи

ГУСТОТА НА ЧАС
ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:

55 000–60 000 шт./га


Умови достатнього

зволоження:

60 000–65 000 шт./га

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СУППОРТЕР ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ СУЛЬФОГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2024 р.



Путренков Сергій,

менеджер з маркетингу, компанія «Байєр»



Новинка в сегменті сульфогібридів від компанії «Байєр» — гібрид під назвою Суппортер. Пізньостиглий, високоврожайний гібрид, інтенсивного типу. Посіви цього гібрида вирівняні, кошик напівнахилений, що позитивно впливає на стійкість до хвороб кошика. Має генетичну стійкість до семи рас вовчка. Характеризується високою посухостійкістю, якісним запиленням та високим рівнем стабільності щодо показників урожайності. Найвищий рівень толерантності має до листових хвороб (це альтернаріоз та іржа), високий рівень відповідно до вугільної гнилі та білої гнилі (прикоренева форма). Гібрид універсальний, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і в усіх кліматичних зонах. Головними перевагами є висока врожайність та олійність.

НОВИНКА

БАЗАЛЛТ

Високоврожайний лінолевий гібрид
під класичну технологію

Тип гібрида: **лінолевий**Група стиглості: **середньостиглий, 110–116 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Біла гниль кошика

6 7 8 9

Біла гниль
прикоренева

6 7 8 9

Вертицильоз

6 7 8 9

Іржа

6 7 8 9

Несправжня
борошниста роса

6 7 8 9

Фомоз

6 7 8 9

Фомопсис

6 7 8 9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6 7 8 9

Стійкість до вилягання

6 7 8 9

Запилення

6 7 8 9

Вміст олії

6 7 8 9

Посуhostійкість

6 7 8 9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Пластичний гібрид із високим рівнем олійності
- Компактний, зручний для збирання
- Стійкий до вилягання
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–F**Вміст олії: **на рівні 46–52%**Висота рослини: **середня**Нахил кошика: **напівнахилений**Маса тисячі насінин: **52–70 грамів**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Посуhostійкість

Якість запилення

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:

55 000–60 000 шт./га


Умови достатнього

зволоження:

55 000–60 000 шт./га

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ БАЗАЛЛЪТ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ КЛАСИЧНИМИ ГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2023–2024 рр.



Мунтян Іван,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур, компанія «Байєр»


Новинка в сегменті класичних гібридів від компанії «Байєр», гібрид під назвою Базальт. Пластичний, середньостиглий гібрид із високим рівнем олійності. Висота рослин нижча за середню, кошик напівнахилений. Має генетичну стійкість до шести рас вовчка. Характеризується високою посухостійкістю, якісним запиленням, стійкістю до вилягання та високим рівнем стабільності щодо показників урожайності. Найвищий рівень толерантності має до таких хвороб, як фомопсис, біла гниль (прикоренева форма) та несправжня борошниста роса, що дає змогу сіяти цей гібрид у ранні строки. Гібрид універсальний, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і в усіх кліматичних зонах. Головними перевагами є високі врожайність та олійність.

НОВИНКА


МЕГАПОЛІС КЛП

Високоврожайний лінолевий
гібрид під технологію Clearfield® PlusТип гібрида: **інтенсивний тип**Група стиглості: **середньоранній, 106–110 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Швидкий старт та ранній розвиток
- Високий потенціал урожайності в поєднанні з ранньою стиглістю
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси

ЗАГАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИСтійкість до вовчка: **раси А–G**Вміст олії: **на рівні 48–52%**Висота рослини: **вище за середню**Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Досить гарна стійкість до посухи

Вирівняність рослин

ГУСТОТА НА ЧАС
ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:


55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:

60 000–65 000 шт./га

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ МЕГАПОЛІС ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ КЛП ГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2023–2024 рр.



■ Врожай, т/га (в перерахунку на вологість 8%) — Вміст олії, %

Чепур Анатолій,

менеджер з технологій вирощування с.-г. культур, компанія «Байєр»



Мегapolis — високоврожайний гібрид під технологію гербіцидного захисту Clearfield® Plus. Середньоранній, лінолевий гібрид, інтенсивного типу. Має генетичну стійкість до вовчка раси G (сьома раса). Virізняється найвищим рівнем стійкості до несправжньої борошнистої роси. Посіви цього гібрида вирівняні. Якщо для вас важливі швидкий старт і ранній розвиток посівів, тоді цей гібрид справді вартий уваги. Високий рівень толерантності має до таких хвороб, як альтернаріоз, фомопсис, вугільна гниль та біла гниль (прикоренева форма). Гібрид універсальний, придатний для вирощування на всіх типах ґрунтів і в усіх кліматичних зонах. Найкраще свій потенціал зможе розкрити в умовах Північної, Центральної та Південної України. Головними перевагами є висока врожайність та високий рівень толерантності до хвороб.

НОВИНКА

ВІВАЛЛЬТО

Високоврожайний лінолевий гібрид
під технологію Clearfield® PlusТип гібрида: **інтенсивного типу**Група стиглості: **ранньостиглий, 100–105 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Біла гниль кошика

6

7

8

9

Вертицильоз

6

7

8

9

Іржа

6

7

8

9

Несправжня
борошниста роса

6

7

8

9

Фомоз

6

7

8

9

Фомопсис

6

7

8

9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток

6

7

8

9

Стійкість до вилягання

6

7

8

9

Запилення

6

7

8

9

Вміст олії

6

7

8

9

Посухостійкість

6

7

8

9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Пластичний гібрид із високим рівнем олійності
- Компактний, зручний для збирання
- Стійкий до вилягання
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси RM9+

ЗАГАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИСтійкість до вовчка: **раси А–G**Вміст олії: **на рівні 48–52%**

Раннє цвітіння та дозрівання

Висота рослин: **нижча за середню**Положення кошика: **нахилений**Потенціал урожайності: **50 ц/га**

Висока стресостійкість

Висока якість запилення

ГУСТОТА НА ЧАС
ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:


55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього

зволоження:

60 000–65 000 шт./гаСкануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ВІВАЛЛЬТО ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ ГІБРИДАМИ. УКРАЇНА, 2023–2024 рр.



Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу, компанія «Байєр»



Вівалльто — високоврожайний гібрид під технологію гербіцидного захисту Clearfield® Plus. Ранньостиглий лінолевий гібрид, має генетичну стійкість до вовчка раси G (сьома раса). Гібрид компактний, добре запилюється, з висотою рослин нижче середньої, що позитивно впливає на стійкість до вилягання та на зручність збирання. Virізняється найвищим рівнем стійкості до несправжньої борошністої роси та високою стійкістю до стресових умов (критичні температури, посуха), що дає змогу сіяти цей гібрид у ранні строки. Гібрид універсальний, придатний для вирощування в усіх кліматичних зонах. Вівалльто — це можливість ранніх термінів сіви, високий ступінь збереженості рослин та високі врожайність і олійність.



ГУДЗОН

Високоврожайний гібрид
під технологію ExpressSun®

Тип гібрида: **лінолевий**
Група стиглості: **ранньостигла, 100–105 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стійкість до посушливих умов
- Високий рівень толерантності до хвороб
- Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси на рівні PL9

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси A-F+**
Вміст олії: **на рівні 48–50%**
Висота рослини: **висока**
Нахил кошика: **нахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Гудзон



■ Показники сезону 2024 р.

Дані з демопосівів.



Чубук Олександр Іванович,
директор, СФГ «ЧАЙКА-2», Київська обл., Броварський р-н

Гібрид соняшнику Гудзон сів уперше та порівнював із гібридом-конкурентом, який вирощував багато років поспіль. Власне, приємно здивований результатом. За нульової технології отримав 3 т із вологістю 6%. Гібрид-конкурент продемонстрував урожайність трохи нижчу — на рівні 2,6 т. Мене вразив розвиток і загальний стан Гудзона, а також його висока олійність, швидкі темпи росту і розвитку.



БЕЛЬВЕДЕР

Високоврожайний гібрид
під класичну технологію

Тип гібрида: **лінолевий**
Група стиглості: **середньорання, 106–110 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Фомоз	6	7	8	9
Фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Високий вміст олії
- Вдала комбінація стійкості до хвороб та посух

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–G**
Вміст олії: **на рівні 48–52%**
Висота рослини: **середня**
Нахил кошика: **нахилений**
Маса тисячі насінин: **57–65 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови:
40 000–50 000 шт./га


Умови помірного зволоження:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Бельведер



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Морозов Віталій Степанович,
головний агроном, ТОВ «Україна», Тернопільська обл., Підволочиський р-н

Соняшник Бельведер ми вирощуємо вже третій сезон. З кожним сезоном площі під ним тільки збільшуються. Цього року в нас 1800 га соняшнику, приблизно 45% із них — це посіви Бельведер. За показники стійкості до хвороб можемо поставити найвищу оцінку. Перед збиранням приблизно 40% рослин ще мали зелені листки, хоча вологість зерна показувала, що він готовий до збирання. Отже, на 3 жовтня вже зібрано два поля, наразі врожайність сягає приблизно 4,3–4,4 т/га. Щодо олійності скажу так: це один із плюсів Бельведера, він показує плюс 1–2% олійності, порівняно з іншими гібридами, що додає йому конкуренції на ринку. Наступного сезону також плануємо 45–50% площ засіяти Бельведером.



ЕЛЕНІС

Стресостійкий гібрид Clearfield® Plus
без обмежень щодо кліматичних зон

Тип гібрида: **лінолевий**

Група стиглості: **середньорання, 105–110 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернarios	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності за вирощування за інтенсивною технологією
- Високий рівень толерантності до хвороб
- Немає фітотоксичності після обробки гербіцидом — немає затримки розвитку

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–F**
Вміст олії: **на рівні 47–49%**
Висота рослин: **середня**
Кошик: **напівнахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Еленіс



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Симоненко Андрій Павлович,
головний агроном, ГК «Лан», Черкаська обл, Черкаський р-н

У господарстві посіяно 700 га гібрида ДК Еленіс. Під час вибору гібридів бралися до уваги дані з демоділянок і товарних посівів більш ніж із 200 гібридів. Упродовж вегетації гібрид ріс рівномірно та мав повноцінне запилення. За середньої врожайності по господарству в цьому сезоні 29 ц/га, Еленіс показує 31 ц/га, але збиральна кампанія триває, і ми очікуємо ще вищий показник по цьому гібридові. Гібридом Еленіс задоволені та плануємо сіяти його і в наступному сезоні.



1018 Л КЛП

Стресостійкий гібрид Clearfield® Plus
без обмежень щодо кліматичних зон

Тип гібрида: **лінолевий**

Група стиглості: **середньорання, 110–115 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Іржа	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Фомоз та фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Висока стійкість до посушливих умов
- Нова генетика з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси (PL9)

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–G**
Вміст олії: **на рівні 46–50%**
Висота рослини: **середня**
Нахил кошика: **нахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності 1018 Л КЛП



■ Показники сезону 2024 р.

Дані з демопосівів.

Ханко Максим,
головний агроном, ДП «Глобинеагропродукт»,
Полтавська обл., Кременчуцький р-н



За рекомендаціями менеджера компанії «Байер» взяли спробувати новинку 1018-Л КЛП у своє господарство. Так склалися кліматичні умови, що дощ у нашому районі не було 43 дні й була жорстока посуха. Ми вже звикли до врожайності на рівні 2 т/га, максимум — 2,5 т/га, але цей гібрид здивував, і поле 50 га ми закрили з урожайністю 2,97 т/га. Була проблема в нашому господарстві в інших гібридах із несправжньою борошністою росю, але на цьому гібридові її взагалі не було, тому ми і вийшли на такі показники. Тож цей гібрид займе гідне місце в нашому господарстві.



ЛЮДМИЛА

Високоврожайний гібрид
під класичну технологію

Тип гібрида: **лінолевий**
Група стиглості: **середньорання, 110–115 днів**

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Альтернاریоз	6	7	8	9
Біла гниль кошика	6	7	8	9
Біла гниль прикоренева	6	7	8	9
Вертицильоз	6	7	8	9
Вугільна гниль	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса	6	7	8	9
Іржа та фомоз	6	7	8	9
Фомопсис	6	7	8	9

АГРОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Стартовий розвиток	6	7	8	9
Стійкість до вилягання	6	7	8	9
Запилення	6	7	8	9
Вміст олії	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності за умов вирощування за інтенсивною технологією
- Висока стійкість до посушливих умов
- Покращений рівень толерантності до фомозу, фомопсису, альтернاریозу та вугільної гнилі

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стійкість до вовчка: **раси А–G**
Вміст олії: **на рівні 48–53%**
Висота рослини: **середня**
Нахил кошика: **напівнахилений**
Маса тисячі насінин: **52–60 грамів**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ


Посушливі умови:
55 000–60 000 шт./га

Умови достатнього зволоження:
60 000–65 000 шт./га



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності Людмила



■ Показники сезону 2024 р.

Дані з демопосівів.

Нечипоренко Максим Петрович,
головний агроном, СТОВ АФ «Маяк»,
Черкаська обл., Золотоніський р-н



У сезоні 2025 за рекомендацією представника компанії «Байер» вирішили спробувати в товарному посіві гібрид-новинку від DEKALB® — сояшник Людмила. Результатом більше ніж задоволенні. Урожайність «на коло» отримали 35,8 ц/га із площі 100 га. До слова, це найбільше серед 6 гібридів сояшнику, які ми висівали в господарстві.

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ





СОНЯШНИК



КУКУРУДЗА



ACCELERON®



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ



CLIMATE FIELDVIEW™



КОМАНДА



Зміст

Особливість селекції DEKALB®	32
Основні переваги насіння DEKALB®	33
Комплексне рішення для кукурудзи	34
Концепція Field Shield	36
Підбір густоти гібрида з урахуванням характеристики поля	38
Реакція гібридів на загущення	39
Боротьба з підробками	40
Портфоліо гібридів кукурудзи 2026	42

ДКС 3747 FS НОВИНКА	44	ДКС 4031	78
ДКС 3937 НОВИНКА	46	ДКС 3969	80
ДКС 4391 ВАКСІ НОВИНКА	48	ДКС 4098 FS	82
ДКС 4533 НОВИНКА	50	ДКС 4014	84
ДКС 4741 НОВИНКА	52	ДКС 3939	86
ДКС 4933 НОВИНКА	54	ДКС 4109	88
ДКС 5148 FS НОВИНКА	56	ДКС 4125	90
		ДКС 4433	92
ДКС 3247	58	ДКС 4391 FS	94
ДКС 3402 FS	60	ДКС 4598 FS	96
ДКС 3400	62	ДКС 4712	98
ДКС 3527	64	ДКС 4897	100
ДКС 3609	66	ДКС 5075 FS	102
ДКС 3796 FS	68	ДКС 5206	104
ДКС 3730	70		
ДКС 3805 FS	72		
ДКС 3710	74		
ДКС 3972 FS	76		

ОСОБЛИВІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ DEKALB®

Селекціонери DEKALB® створюють нові насіннєві продукти для аграріїв, які працюють на великих площах. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб ідентифікувати та відстежити характеристику, яка може допомогти рослині краще реалізувати свій потенціал у конкретних умовах вирощування. Цей процес потрібно повторювати протягом кількох поколінь рослин, аби переконатися в тому, що бажану ознаку успішно вдосконалено. Передові технології, генетика та дослідницька мережа DEKALB® дають змогу значно прискорювати процес удосконалення зародкової плазми й використовувати найкращий генетичний матеріал і генетичну різноманітність з усього світу.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДУКТИ ТА КОРИСНА АНАЛІТИКА

Цифрові технології (від датчиків до супутників і автоматизованих зрошувальних систем) використовують для створення передових продуктів та надання ефективних рекомендацій, щоб підвищити стабільність сільськогосподарського виробництва.

АВТОМАТИЗОВАНЕ МАРКУВАННЯ НАСІННЯ ДЛЯ ГЕНЕТИЧНОГО КАРТУВАННЯ

Забезпечує селекціонерів інформацією про кожну насінину: з великого генофонду насіннєвого матеріалу за короткий час вибирають потенційно цінні продукти, які будуть максимально адаптовані до реальних польових умов.



ІННОВАЦІЇ У ПРАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

Робота з інноваційними цифровими партнерами, зокрема з The Climate Corporation — дочірньою компанією ТОВ «Байєр», та передовими технологіями дає змогу селекціонерам комбінувати безліч наборів даних для ефективнішого використання ресурсів і визначення найкращих продуктів.

АНАЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ НА ОСНОВІ ТОЧНИХ ДАНИХ

Збільшують кількість досліджуваних продуктів на початку селекційного процесу та визначають, які продукти є найкращими для тестування в конкретних умовах. Допмагають селекціонерам робити більш обґрунтований вибір на початкових етапах роботи, забезпечуючи більш тривалий термін випробування в конкретних умовах перед виходом на ринок.

Більш ніж 120 локацій у понад 25 країнах, що використовують глобальну зародкову плазму, щоб визначити генетичні характеристики, які найкраще відповідають конкретним умовам

Прийняття рішень на основі ефективного аналізу даних у стисліші терміни, що дає змогу проводити випробування у більш різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах

Рекомендації аграріям щодо підвищення врожаїв та мінімізації ризиків із застосуванням методів і прийомів сучасного сільськогосподарського виробництва

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАСІННЯ DEKALB®

УРОЖАЙНІСТЬ

Досягнення максимального потенціалу врожайності з використанням інноваційних підходів. Нове покоління гібридів є втіленням інновацій у селекційному процесі, які покращують їхню адаптивність та пластичність, забезпечуючи прибутковість за будь-яких умов вирощування.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Отримання з року в рік стабільного рівня врожайності навіть за умов лімітованого ресурсу ґрунтової вологи та підвищеного впливу повітряної посухи.

ВОЛОГОВІДДАЧА

Використання гібридів зі швидкими темпами вологовіддачі зерна в качанах перед збиранням дає змогу максимально реалізувати тепловий біокліматичний ресурс для гібридів із вищим ФАО, а також заощадити енергетичні витрати на його досушування.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Забезпечення додаткового врожаю і доходу завдяки ефективному захисту від комплексу хвороб, які поширюються через насіння.

ПОТУЖНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА ТА СТЕБЛО

Гарантоване збереження потенційно можливих втрат внаслідок вилягання завдяки утримувальній здатності стебла та добре розвинутій кореневій системі, а також можливість значного пролонгування термінів збирання культури.



ЗАВЖДИ ПОРУЧ — ІЗ КОМПЛЕКСНИМ АСОРТИМЕНТОМ

Наші рішення гарантують, що ми завжди будемо поруч у вашій подорожі: від планування сезону, сівби, боротьби з бур'янами, хворобами та шкідниками і до збирання врожаю й аналізування сезону.

6 ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

Оберіть правильний час і насолоджуйтесь успішним збиранням урожаю.

CLIMATE
FIELDVIEW
Yield Map

5 БОРІТЬБА З ХВОРОБАМИ ТА ШКІДНИКАМИ


Контролюйте шкідники та інші загрози на ваших полях.




CLIMATE
FIELDVIEW



1



6



5

CLIMATE

FIELDVIEW

ЦИФРОВИЙ ПАРТНЕР У ВАШІЙ ПОДОРОЖІ:

FieldView™ має функції, які допоможуть вам на кожному етапі протягом сезону.

1 ПЛАНУВАННЯ

Спираючись на знання, отримані минулого сезону, виберіть найкращі гібриди для ваших умов вирощування.



CLIMATE
FIELDVIEW

Seed Script



2 СІВБА

Виберіть найкращу густоту посіву для своїх полів і захистіть свої інвестиції за допомогою повної пропозиції щодо вирощування.



acceleron

CLIMATE
FIELDVIEW

3 БОРОТЬБА З БУР'ЯНАМИ

Очистіть свої поля від бур'янів та оберіть найкраще рішення з-поміж наших високоефективних гербіцидів.

АДЕНГО»

ЛАУДІС

Мерлін
Флекс дуо

Раундап

МайсТер
пауер

4 МОНІТОРИНГ ПОСІВІВ ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Контролюйте свої поля — на основі супутникових даних: стежте за станом здоров'я посівів та перевіряйте рівень випаровування.

CLIMATE
FIELDVIEW

Maps

КОНЦЕПЦІЯ FIELD SHIELD

Field Shield — концепт максимально ефективного використання інноваційної генетики DEKALB® у протидії абіотичним факторам упродовж активної вегетації кукурудзи для вбезпечення ризиків непрогнозованого зниження потенціалу продуктивності гібридів та гарантії найкращого застосування лімітованого або незбалансованого ресурсу функціонування біологічних систем.

Гібриди з логотипом Field Shield — відселектовані шляхом багаторівневих оцінок, які синергічно поєднують у своїх геномах стійкі генетичні комплекси, що зумовлюють стабільно стійке проходження всіх фізіологічних процесів за несприятливих умов впливу зовнішніх факторів середовища впродовж усього вегетаційного періоду та створюють передумови реалізації максимально досяжного потенціалу продуктивності.



НОВЕ РІШЕННЯ
БРЕНДУ DEKALB®
ВІД КОМПАНІЇ
«БАЙЄР»



FIELD SHIELD

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДІВ FIELD SHIELD

- Покращена функціональність ферментних систем для регулювання процесів фотосинтезу в стресових умовах (перепади температур та зволоження).
- Поліпшена архітектура рослин і саморегуляція транспіраційного коефіцієнта, що стабілізує ефективність синтезу органічної речовини.
- Покращене співвідношення продуктивної й непродуктивної частки врожаю на користь зернової частки.
- Висока толерантність до основних захворювань листків, стебел і качана та сильна регенераційна здатність тканин.
- Збалансоване поєднання рядності, кількості зерен у ряді і питомої маси зерна в качані, що мінімізує ризики впливу стресу протягом періоду цвітіння — формування зерна.
- Підвищена життєздатність пилових зерен та стовпчиків приймочок за умов водного стресу й зниженої відносної вологості повітря.
- Ефективна коренева система та її здатність забезпечувати кращу терморегуляцію рослин на ранніх і критичних стадіях росту й розвитку рослин.

ПІДБІР ГУСТОТИ ГІБРИДА З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ

Густоту посіву (норму висіву) обирають відповідно до конкретного гібрида та умов вирощування, оскільки кожен гібрид по-різному реагує на польові умови й підібрану густоту.


У технологічних центрах DEKALB® ми ретельно випробовуємо наші гібриди з різними густотами та в різних умовах вирощування. Ми отримуємо тисячі вимірювань для створення графіків норм реакції на густоту сівби для кожного гібрида DEKALB®, щоб оцінити їх поведінку в різних ґрунтово-кліматичних умовах і визначити оптимальну густоту.

Застосування цих рекомендацій допомагає максимізувати врожайність.

Показниками врожайності кукурудзи є кількість качанів на гектар, рядів зерен у качані, числа зерен у ряду та маса зерна з качана. На ці показники впливають генетика, технологічні заходи й навколишнє середовище. Гібриди мають індивідуальну реакцію на довкілля та густоту, що пов'язано зі здатністю підтримувати компоненти врожайності за високої або зниженої густоти стояння рослин.

Гібриди кукурудзи з вищим ступенем компенсаторної здатності можуть збільшувати розмір качана у відповідь на меншу густоту стояння рослин (блакитний профіль), забезпечуючи такий самий рівень урожайності, як і за вищих густот. Гібриди зі стабільним або «фіксованим» типом качана, як правило, формують вищу врожайність за умови збільшення густоти стояння рослин.

РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ НА ГУСТотУ




РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ НА ЗАГУЩЕННЯ


ВИБІР ГІБРИДА

ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ЗАГУЩЕННЯ

Розмір качанів залишається стабільним за різної густоти посіву.




Гібрид 1 дає змогу отримати максимальний урожай за густоти посіву 85 000 рослин/га




ВИСОКА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЗАГУЩЕННЯ

Що вище густота, то більше змінюється розмір качана.



Гібрид 2 дає змогу отримати максимальний урожай за густоти посіву 70 000 рослин/га



НАСІННЯ БАЙЄР DEKALB® ТЕПЕР ЗАХИЩЕНЕ ГОЛОГРАМОЮ



**Чи можна підробити якість?
Звичайно, ні. Але дехто все одно намагається.**


З одного боку, ми мали б пишатися цим фактом. Адже зрештою це доказ вашої довіри до нашого насіння. З іншого – ви заслуговуєте на справжній потенціал оригінального насіння Bayer. Саме тому мішки з насінням DEKALB® тепер постачаються із захисною голограмою Bayer Safety Seal, яка дає змогу легко перевірити оригінальність насіння Bayer та уникнути підробок. Захисна голограма Safety Seal розміщена на нижній частині мішків.




Як працює захист мішків?

Захисна пломба містить голограму з хрестом Bayer та унікальним QR-кодом. Цей QR-код можна відсканувати за допомогою додатку Bayer Seal Scan. Зісканувавши QR-код, ви відразу отримаєте інформацію, чи насіння оригінальне.


Завантажте безкоштовний додаток Bayer Seal Scan з AppStore (для iOS) або PlayMarket (для Android). У ньому також можна перевірити оригінальність засобів захисту рослин Bayer.




Відскануйте QR-код на голограмі та миттєво дізнайтеся результат. Якщо QR-код було відскановано забагато разів, ви отримаєте відповідне повідомлення. Якщо виникли сумніви, будь ласка, зверніться до представника компанії «Байєр».



Код дійсний



Код невідомий.
Додаток не може перевірити код.



Це підробка.
Не використовуйте цей продукт та повідомте нас.

Байєр не замовляє перетруєння чи будь-яку іншу додаткову обробку насіння, що призводить до його перепакування. Саме на насіння в оригінальній упаковці, придбане в наших офіційних партнерів, поширюється гарантія виробника та технічна підтримка професійної команди «Байєр».

Перевірити перелік партнерів можна у нас на сайті:
www.cropscience.bayer.ua

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ 2026

НАЗВА ГІБРИДА	ФАО	ТИП ЗЕРНА	ГРУПА СТИГЛОСТІ
ДКС 3747 FS* НОВИНКА	260	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3937 НОВИНКА	290	Зубовидний	Середньорання
ДКС 4391 ВАКСІ НОВИНКА	350	Восковидний	Середньопізня
ДКС 4533 НОВИНКА	360	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4741 НОВИНКА	370	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4933 НОВИНКА	390	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 5148 FS* НОВИНКА	410	Зубовидний	Пізностигла
ДКС 3247	200	Зубовидний	Ранньостигла
ДКС 3402 FS*	230	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3400	240	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3527	250	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3609	260	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3796 FS*	270	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3730	280	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3805 FS*	280	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3710	290	Зубовидний	Середньорання
ДКС 3972 FS*	300	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4031	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 3969	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4098 FS*	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4014	310	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 3939	320	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4109	320	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4125	330	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4433	340	Зубовидний	Середньостигла
ДКС 4391 FS*	350	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4598 FS*	360	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4712	370	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 4897	380	Зубовидний	Середньопізня
ДКС 5075 FS*	410	Зубовидний	Пізня
ДКС 5206	420	Зубовидний	Пізня

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДА						РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ		
Стабільність та пластичність	Посухоустійкість	Початкова енергія росту	Стійкість до фузаріозу стебла / кінча	Вологовіддача	Холодостійкість	Посушливі умови	Умови нестійкого зволоження	Умови достатнього зволоження
8	8	9	8	8	9	50 000 – 55 000	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
8	8	9	9	8	9	–	65 000 – 750000	75 000 – 85 000
8	8	8	9	8	8	50 000 – 55 000	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	9	8	9	8	8	50 000 – 55 000	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
8	8	9	9	8	8	50 000 – 60 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	8	7	8	9	9	50 000 – 60 000 (на зрошенні: 85 000 – 95 000)	65000-75000	75000-80000
9	9	8	9	8	9	50 000 – 60 000 (на зрошенні: 80 000 – 90 000)	60 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	7	8	8	8	9	–	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
8	8	8	9	8	9	–	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	7	9	9	8	9	–	75 000 – 80 000	75 000 – 80 000
9	8	9	9	8	9	55 000 – 60 000	70 000 – 75 000	75 000 – 80 000
9	7	8	9	9	9	–	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	8	9	9	8	8	–	60 000 – 70 000	70 000 – 75 000
9	8	8	9	9	8	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000	75 000 – 80 000
9	8	9	8	9	9	50 000 – 60 000	60 000 – 65 000	65 000 – 75 000
8	8	9	9	8	8	–	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	9	8	9	8	9	55 000 – 60 000	60 000 – 70 000	70 000 – 80 000
8	7	9	9	9	8	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
9	8	9	9	9	9	55 000 – 60 000	60 000 – 70 000	70 000 – 75 000
9	9	8	9	9	8	50 000 – 55 000 (85 000 – 90 000)**	60 000 – 65 000	75 000 – 80 000
9	9	8	8	9	8	50 000 – 55 000	55 000 – 60 000	65 000 – 75 000
9	9	8	9	7	9	55 000 – 65 000	65 000 – 75 000	70 000 – 80 000
8	8	8	9	9	8	–	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	9	9	9	7	8	55 000 – 65 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	8	7	9	8	8	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000	70 000 – 75 000
8	9	9	8	9	9	50000 – 60000	65 000 – 70 000	75 000 – 80 000
9	9	8	9	7	9	50 000 – 60 000 (85 000 – 90 000)**	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	8	9	9	9	9	50 000 – 55 000	60 000 – 65 000	70 000 – 75 000
9	8	8	9	8	8	50 000 – 55 000 (80 000 – 90 000)**	60 000 – 65 000	65 000 – 70 000
8	8	9	9	8	8	50 000 – 55 000 (85 000 – 90 000)**	55 000 – 60 000	65 000 – 70 000
8	8	8	9	8	8	50 000 – 55 000 (85 000 – 95 000)**	60 000 – 65 000	65 000 – 70 000


* — FS (Field Shield), більш детальна інформація — на стор. 36–37

** — для зрошення

НОВИНКА

ДКС 3747 FS

ФАО 260



Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в групі середньоранніх гібридів
- Адаптивність до ґрунтів різного механічного складу
- Висока холодостійкість та енергія початкового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6

7

8

9

Посухостійкість

6

7

8

9

Початкова енергія росту

6

7

8

9

Стабільність та пластичність

6

7

8

9

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6

7

8

9

Холодостійкість

6

7

8

9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**Умови нестійкого зволоження: **70 000–75 000 шт./га**Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**


ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:

Усі зониВідношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтівРівень мінерального живлення:
середній, високийРекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, No-tillageТемпература ґрунту в період сівби: **7°C**Відношення до монокультури:
витримує монокультуруВідношення до перестою:
витримує нетривалий перестійГібрид рекомендовано:
для зернового використання

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3747 FS



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Дячук Володимир,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»



ДКС 3747 характеризується високим потенціалом продуктивності у зонах достатнього та нестійкого зволоження і водночас може забезпечувати стабільний рівень урожайності в зонах із недостатнім зволоженням. Раннє цвітіння, добрий стартовий ріст, висока холодостійкість на ранніх стадіях, сильна коренева система роблять гібрид пластичним для різних умов вирощування. Гібрид адаптивного типу і може вирощуватися на ґрунтах легкого механічного складу.

НОВИНКА



ДКС 3937

ФАО 290

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в зонах достатнього та нестійкого зволоження
- Адаптивність до різних систем обробітку ґрунту
- Висока холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посухостійкість

6 7 **8** 9

Початкова енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–75 000 шт./га**Умови достатнього зволоження: **75 000–85 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зона достатнього та нестійкого зволоження

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів (за винятком піщаних)

Рівень мінерального живлення:
високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3937



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Чепур Анатолій,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»



ДКС 3937 — середньоранній гібрид із високим потенціалом продуктивності та пластичністю переважно в зонах достатнього і нестійкого зволоження. Висока холодостійкість на початкових етапах росту та розвитку, сильна коренева система, інтенсивний стартовий ріст — характеристики гібрида, які забезпечують його стабільність під час вирощування за різних систем обробітку ґрунту та після різних попередників. Гібрид краще реалізує свій потенціал на високих фонах живлення. Рослини високорослі з вираженим ефектом «stay green» і високою якістю зерна, що дає змогу вирощувати його як на зерно, так і на силос.

НОВИНКА



ДКС 4391 ВАКСІ

ФАО 350

Тип зерна: **восковидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока якість зерна (підвищений уміст амілопектину)
- Високий потенціал продуктивності
- Сильна коренева система та стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
усі зони

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів (піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **9°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру

Відношення до перестою:
витримує нетривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4391 ВАКСІ




**ОЧІКУЄМО ДАНІ
З ПОЛІВ**

Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу,
компанія «Байєр»



Гібрид ДКС 4391 WX є унікальним завдяки поєднанню високої якості зерна і технологічних характеристик. Гібрид має високий потенціал урожайності та стабільність у різних біозонах, адаптований до різних систем обробітку ґрунту і попередників. Основні передумови отримання високих результатів: здорове та міцне стебло, сильна коренева система, пакет стійкості до хвороб стебла й качана.

НОВИНКА



ДКС 4533

ФАО 360

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність в усіх зонах вирощування
- Висока посухостійкість
- Оптимізована архітектура рослин на користь продуктивної частки врожаю

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
усі зони

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4533



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Стахів Мирослава,
менеджер з маркетингу,
компанія «Байєр»



ДКС 4533 — інновація в портфоліо DEKALB®! Гібрид, який забезпечує високий потенціал продуктивності та стабільність у різних ґрунтово-кліматичних зонах. ДКС 4533 рекомендований для вирощування також у посушливих умовах, завдяки своїй високій посухо- та жаростійкості. Гібрид толерантний до загущення, але в умовах недостатнього вологозабезпечення проявляє високу компенсаторну здатність за рахунок крупного і натурного зерна. Компактні за висотою рослини, сильна коренева система та здорове, міцне стебло забезпечують стійкість до вилягання і придатність до пізніх термінів збирання.

НОВИНКА



ДКС 4741

ФАО 370

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність в зонах достатнього та нестійкого зволоження
- Висока енергія початкового росту
- Стійкість до хвороб стебла та качана

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посуhostійкість

6 7 **8** 9

Початкова енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000 шт./га**Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зона достатнього та нестійкого зволоження

Відношення до ґрунтів:
Для всіх типів ґрунтів (піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний, Strip-till

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує нетривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового і силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4741



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.


Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу,
компанія «Байер»



Гібрид ДКС 4741 характеризується високим потенціалом продуктивності у своїй групі стиглості і краще його реалізує в зонах достатнього та нестійкого вологозабезпечення. Пластичність і стабільність гібрида досягається завдяки високій енергії старту росту, сильній кореневій системі та високій стійкості до хвороб стебла і качана.

Гібрид ліпше вирощувати в нижніх діапазонах густот, де він краще реалізує свій потенціал. Висока натура зерна створює передумови хорошої посухостійкості на момент наливу зерна. Гібрид добре адаптований як до високих, так і середніх рівнів живлення, різних попередників і систем обробітку ґрунту.

НОВИНКА



ДКС 4933

ФАО 390

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в зонах достатнього та нестійкого зволоження
- Сильна коренева система та міцне стебло
- Висока холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посухостійкість

6 7 **8** 9

Початкова енергія росту

6 **7** 8 9

Стабільність та пластичність

6 7 **8** 9

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000**(на зрошенні — **85 000–95 000**) шт./гаУмови нестійкого зволоження: **65 000–75 000** шт./гаУмови достатнього зволоження: **75 000–80 000** шт./га

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:

Усі зони

Відношення до ґрунтів:

для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:

високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:

традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **8°C**

Відношення до монокультури:

витримує монокультуру

Відношення до перестоя:


витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:

для зернового використання

Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4933



■ Показники сезону 2023 р.

■ Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Мовчан Ігор,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»

ДКС 4933 гібрид із компактним типом рослин та характерним еректоїдним розташуванням листкових пластинок. Раннє цвітіння створює передумови ефективного запилення, а сильне коренева система та стебло забезпечують повноцінний налив зерна. Гібрид позитивно реагує на загущення і може вирощуватися за високих норм висіву на зрошенні, водночас формує крупне зерно на знижених нормах висіву. Важливою характеристикою гібрида є його холодостійкість та адаптованість до різних систем обробітку ґрунту.

НОВИНКА

ДКС 5148 FS

ФАО 410



Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **пізньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність за умов вирощування в богарних умовах та на зрошенні
- Сильна коренева система та міцне стебло
- Висока холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 8 **9**

Посухостійкість

6 7 8 **9**

Початкова енергія росту

6 7 **8** 9

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 8 **9**

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000**(на зрошенні — **80 000–90 000**) шт./гаУмови нестійкого зволоження: **60 000–70 000** шт./гаУмови достатнього зволоження: **70 000–75 000** шт./га

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
усі зони

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів
(піщані — за умови достатнього вологозабезпечення)

Рівень мінерального живлення:
Середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
Традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage

Температура ґрунту в період сівби: **7°C**

Відношення до монокультури:
Витримує монокультуру


Відношення до перестояю:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового і силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 5148



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Мунтян Іван,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»

Гібрид ДКС 5148 — це поєднання високого потенціалу та пластичності. Гібрид максимально реалізує свій потенціал на зрошенні, а також може вирощуватися на богарі навіть у зонах із критичним вологозабезпеченням. До важливих характеристик гібрида слід віднести: високу холодостійкість на ранніх стадіях росту й розвитку, добру енергію стартового росту, стійкість до хвороб стебла та качана. Завдяки міцному стеблу і сильній кореневій системі гібрид можна вирощувати за високих норм висіву (на зрошенні), а хороша компенсаторна здатність завдяки великій масі 1000 насінин дає змогу використовувати низькі норми висіву в умовах недостатнього вологозабезпечення. Гібрид добре адаптований як до високих, так і середніх рівнів живлення, різних попередників та систем обробітку ґрунту.



ДКС 3247


ФАО 200

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **ранньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності в групі ранньостиглих гібридів
- Адаптивність до різних рівнів мінерального живлення
- Придатність до вирощування на всіх типах ґрунтів за механічним складом

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **70 000–75 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зони достатнього та нестійкого зволоження

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту:
традиційний, мінімальний

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує нетривалий перестій

Гібрид рекомендовано:
для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3247



■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Любар Віктор,
експерт з технологічного супроводу насіннєвого бізнесу,
компанія «Байєр»

Гібрид ДКС 3247 характеризується високим потенціалом продуктивності в ранньостиглій групі. Завдяки сильній кореневій системі та міцному стеблю добре адаптований до легких за механічним складом ґрунтів. Добра холодостійкість на початкових стадіях росту і стійкість до хвороб стебла забезпечують можливість раннього висіву. Гібрид може вирощуватися як на середніх, так і високих фонах живлення й краще реалізує потенціал у зонах достатнього та нестійкого зволоження.



ДКС 3402 FS

ФАО 230

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність
- Адаптованість до легких ґрунтів
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **потребує збирання в оптимальні терміни**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3402 FS




- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.

Маслов Юрій Анатолійович,
агроном, ПСП «Граніт»,
Житомирська обл., Звягільський р-н



З компанією Bayer маємо позитивний досвід роботи, широко використовуємо ЗЗР та насіння кукурудзи — 30% від загальної площі. ДКС 3402 вирощуємо на наших площах з моменту його виходу на ринок. Гібрид відзначається стабільно високими врожаєм, незважаючи на щорічні примхи природи, добре себе проявляє, яку посушливі, так і у вологі роки. Тож з року в рік маємо врожайність у межах 125 ц/га за базової вологості 14%. Цього року, попри несприятливі умови червня, а це значні коливання температури, холодні ночі, гібрид знову ж проявляє себе лише з позитивного боку: качан повністю запилений, має 18 рядів зерна та гарну озерненість у рядках, тому очікуємо на привабливий урожай. Основні переваги цього гібрида: стабільно високі врожаї, швидка вологовіддача, висока посухостійкість і холодостійкість. Плануємо й надалі висівати цей гібрид у наших товарних посівах кукурудзи.



ДКС 3400


ФАО 240

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність
- Адаптованість до легких ґрунтів
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **75 000–80 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **для всіх типів ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує нетривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3400



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Ткачук Віктор Іванович,
агроном, ТОВ «Ремавтокомплект-Сервіс»,
Сумська обл., Конотопський р-н

У нашому господарстві, яке розташоване в Конотопському районі Сумської області, уже кілька років поспіль висіваємо гібриди кукурудзи DEKALB®, адже вони мають стабільність та високу врожайність. Цього року гібрид ДКС 3400 показав високу енергію енергії старту росту, холодостійкість і швидку вологовіддачу навіть за складних кліматичних умов, забезпечуючи стабільно високий результат. ДКС 3400 довів свою ефективність на наших ґрунтах, що дає змогу оптимізувати витрати й спланувати врожайність. DEKALB® цьогоріч знову підтверджує статус надійного партнера для нашого господарства.



ДКС 3527

ФАО 250

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність
- Адаптованість до легких ґрунтів
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посухостійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стойкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **70 000–75 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування:
зони достатнього та нестійкого зволоження (частково недостатнього)

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів, за винятком важких суглинків

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till**

Температура ґрунту в період сіви: **від 8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестою:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3527



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Дячук Володимир,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
компанія «Байєр»

ДКС 3527 добре реалізує потенціал у зонах достатнього та нестійкого зволоження. Специфіка гібрида — збалансовані параметри рослин, сильна коренева система і висока енергія початкового росту. Гібрид добре реалізує потенціал ґрунту і його можна вирощувати після гірших за вологозабезпеченням попередників (соняшник, цукрові буряки). Позитивно реагує на інтенсифікацію живлення.



ДКС 3609


ФАО 260

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Стійкість до хвороб стебла та качана
- Міцне стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком піщаних**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**


Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3609



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Широкоступ Олексій Леонідович,
головний агроном, ТОВ «Стейк Агро»,
Київська обл., Бориспільський р-н

Ми давно «знайомі» з гібридами бренду DEKALB®, а саме — з 2018 року щосезону вирощуємо їх кукурудзу на полях ТОВ «Стейк Агро». Чому саме DEKALB®? Ці гібриди придатні для нашого типу ґрунтів та під кліматичні умови вирощування, мають чудову вологовіддачу. Маємо пізні посіви, тому для нас важливо, щоб гібрид швидко скидав вологу восени. Гібрид ДКС 3609 уперше випробували у 2023 році в демопосіві, були задоволені результатами — 122 ц/га (за базової вологості), вологість на момент збирання — 19,5%. Тож на сезон 2024 взяли його на 20 га, аби перевірити, як гібрид покаже себе у виробничих посівах. І ДКС 3609 не підвів. Зібрали 134 ц/га із вологістю 18%, хоч ФАО і невисоке — 260, та виходячи з типу ґрунту в господарстві (легкий), обробіток є мінімальним та з вмістом азоту в ґрунті 90 кг/га. Завдяки оптимальному ФАО та високій вологовіддачі гібрид не уражується хворобами, оскільки не потрапляє під осінні опади й заморозки. Швидке дозрівання, висока маса тисячі насінин, виповнений качан — це все про ДКС 3609. У наших планах — вирощувати гібриди DEKALB® і наступного року (на 30% площ під кукурудзою), а площі під ДКС 3609 плануємо збільшити до 100 га.



ДКС 3796 FS


ФАО 270

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал продуктивності
- Висока холодостійкість
- Висока енергія стартового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **60 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих і піщаних**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3796 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Юраш Сергій Миколайович,
агроном, ТОВ «УЇФК-АГРО»,
Київська обл., Броварський р-н

Посухостійкий пластичний гібрид, має високий потенціал урожайності, стресостійкий, гарно скидає вологу навіть за умови пізніх строків висіву на торф'яних ґрунтах. Висіяли 26.05.2024 на площі 86,5 га. Урожайність — 9,2 т/га в перерахунку на базову вологість. Збирали з вологістю 20–21%.



ДКС 3730


ФАО 280

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний до вирощування у різних умовах
- Міцна коренева система
- Швидка вологовіддача

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3730




Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Курчинський Андрій Вікторович,
заступник директора з рослинництва, ТОВ «Агросоюз»,
Житомирська обл., Звягільський р-н



Кукурудза в господарстві є основною бюджетоутворюючою культурою. І значне місце в її посівах займає бренд DEKALB® — близько 35%. Гібрид ДКС 3730 сіємо п'ять сезонів поспіль, з року в рік його урожайність перебуває в межах 125–130 ц/га. У 2025 році в посівах господарства площа ДКС 3730 становить 150 га. До основних переваг хочу віднести високу натуру зерна, про що свідчать отримані врожаї. Гібрид є одним із найкращих у лінійці DEKALB® за своєю пластичністю до умов вирощування, а це щорічні виклики погодних умов, зміна типів ґрунтів тощо. Має високу вологовіддачу, попри різні терміни збирання. Одна з ключових переваг — стійкість до вилягання. Розраховуємо на приємні результати врожайності цього гібрида і в сезоні 2025 року.



ДКС 3805 FS

ФАО 280

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока адаптивність до різних технологій
- Висока холодостійкість
- Сильна коренева система

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 7°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3805 FS



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.


Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Туревич Ігор Вікторович,
директор, ТОВ «Попільнянський комбикормовий завод»,
Житомирська обл., Попільнянський р-н

Маю досвід вирощування кукурудзи бренду DEKALB® не перший рік, і поступово рік за роком цей бренд став займати 100% площі наших посівів кукурудзи. Зважаючи на зону та умови вирощування, віддаємо перевагу під час вирощування гібридам середньоранньої та середньостиглої групи стиглості, серед яких значний відсоток у структурі займає ДКС 3805. Гібрид характеризується: гарною початковою енергією росту і чудовою холодостійкістю; пластичністю та посухостійкістю; потужним стеблом та кореневою системою; вологовіддачею на рівні більш ранніх гібридів; високим потенціалом урожайності за 120 ц/га в наших умовах. Тому для себе зробили висновки, що цей гібрид якнайкраще придатний до умов та технології, яку ми використовуємо. Це буде гарне та потужне доповнення нашої лінійки кукурудзи.



ДКС 3710

ФАО 290

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньорання**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Висока енергія початкового росту
- Міцні стебло і коренева система

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 **8** 9

Посухостійкість

6 7 **8** 9

Початкова
енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність
та пластичність

6 7 **8** 9

Стойкість до фузаріозу
стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на супіщаних, суглинкових та глинистих ґрунтах**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3710



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Тарасюк Дмитро Сергійович,
директор, СТОВ «Тетірське»,
Житомирська обл., Житомирський р-н

У нашому господарстві ключову роль у досягненні прибутків відіграє тваринництво, тому значною мірою ми залежні від об'ємів заготівлі якісних кормів, а це і кукурудза на силос. Маємо досвід висівання гібрида DEKALB® на силос, а саме: проводили разом із Bayer дослід з вирощування ДКС 3710 у наших умовах на силос. Своїми результатами цей гібрид нас приємно здивував, зокрема, мав значну перевагу (у 100 ц/га) над гібридами, які ми використовуємо в себе в господарстві на силос. Гібрид відзначається значною висотою стебла, має здатність зберігати зелене забарвлення та соковитість листя навіть за стресових умов, зерно має високий вміст крохмалю, що потрібно для якісного корму. Також хочеться зазначити, що він має високий потенціал як гібрид для зернового напрямку, що важливо, тому що ми завжди плануємо більші площі посіву для уникнення ризиків недобору корму в нашій зоні вирощування. Також у подальшому плануємо введення в структуру зернового напрямку вирощування кукурудзи, де також використовуватимемо гібриди Bayer.



ДКС 3972 FS

ФАО 300

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Холодостійкість
- Високий потенціал урожайності
- Міцне стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3972 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Хрупало Микола Іванович,
агроном, ПП «Вікніни»,
Тернопільська обл., Чортківський р-н

Кукурудза — одна з ключових культур, яку вирощує наше господарство. Ми завжди приділяємо багато уваги під час вибору гібридів, які плануємо вирощувати, оскільки значна частина полів розміщена на горбистій місцевості, а деякі поля взагалі на глинистих ґрунтах. Ми вже кілька сезонів поспіль обираємо гібрид ДКС 3972, оскільки він завжди досить добре поводить себе в наших умовах. ДКС 3972 зарекомендував себе як гібрид, що має високі стресостійкість, пластичність, адаптивність і необмежений потенціал урожайності. Цей гібрид завжди виправдовує наші сподівання та показує рекордно високі показники врожайності за будь-яких умов.



ДКС 4031

ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал та стабільність у зонах достатнього і нестійкого зволоження
- Адаптивність до різних систем обробітку ґрунту
- Висока енергія початкового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 8 **9**

Посуhostійкість

6 **7** 8 9

Початкова енергія росту

6 7 8 **9**

Стабільність та пластичність

6 7 **8** 9

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**

Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **зони достатнього та нестійкого зволоження (частково недостатнього)**

Відношення до ґрунтів: **для всіх типів ґрунтів, за винятком піщаних**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує нетривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4031



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Чепур Анатолій,
менеджер з технологій вирощування с.-г. культур,
ТОВ «Байєр»

ДКС 4031 — середньостиглий гібрид із високим потенціалом продуктивності та пластичністю переважно в зонах достатнього і нестійкого зволоження. Сильна коренева система та стебло дають змогу вирощувати гібрид за будь-яких систем обробітку ґрунту, а стійкість до хвороб качана і швидка вологовіддача забезпечують високу рентабельність його вирощування. Гібрид краще реалізує свій потенціал на високих фонах живлення та нижніх діапазонах рекомендованих густот. ДКС 4031 добре запилюється і формує крупне зерно.



ДКС 3969


ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний до вирощування у різних умовах
- Швидка вологовіддача
- Швидка енергія початкового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **потребує збирання в оптимальні строки**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3969



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Базиленко Дмитро Павлович,
директор, ТОВ «Праця Стольне»,
Чернігівська обл., Корюківський р-н

У цьому сезоні за доволі екстенсивної технології гібрид ДКС 3969 показав себе на високому рівні. Із площі 180 га ми зібрали його з урожайністю 115 ц/га. Навіть за умов цьогорічної повітряної посухи він мав повністю заплений та виповнений качан. На наступний рік ми плануємо 100% площ засіяти кукурудзою бренду DEKALB®, із яких 20% займатиме саме цей гібрид.



ДКС 4098 FS


ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Адаптованість до різних технологій
- Посухостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000**,
на зрошенні — **85 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує нетривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4098 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Мерва Ігор Володимирович,
керівник СФГ «Тюльпан»,
Тернопільська обл., Тернопільський р-н



З гібридами кукурудзи DEKALB® ми «знайомі» дуже давно, завжди задоволені результатами врожайності, менше 17 т/га не отримуємо. Якщо говорити про гібрид ДКС 4098, вирощуємо його вже кілька років поспіль. Минулого року цей гібрид був одним із лідерів за врожайністю на нашому полі, а цьогоріч — має також дуже гарний вигляд. Весна була доволі холодною, але завдяки правильним підходам до технології сівби ми отримали рівномірні сходи рослин. ДКС 4098 показав високу енергію росту, добре запилені качани, 18–20 рядів зерен. Цей гібрид справді вартий уваги. Він дає стабільність і впевненість у врожайності, навіть за непростих умов. Можу сміливо його рекомендувати для вирощування іншим аграріям, оскільки це саме той гібрид, який демонструє високу продуктивність.



ДКС 4014

ФАО 310

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний до вирощування у різних умовах
- Швидка вологовіддача
- Посухостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 8 **9**

Посухостійкість

6 7 8 **9**

Початкова енергія росту

6 7 **8** 9

Стабільність та пластичність

6 7 8 **9**

Стійкість до фузаріозу стебла/качана

6 7 **8** 9

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **55 000–60 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів, за винятком важких глинистих**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 10°C**

Відношення до монокультури: **краще реалізує потенціал за вирощування в сівозміні**


Відношення до перестою: **потребує збирання в оптимальні терміни**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4014



■ Показники сезону 2023 р.

■ Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Лісовий Володимир Григорович,
власник господарства, ТОВ «Годунівське»,
Київська обл., Бориспільський р-н



ДКС 4014 стабільний протягом багатьох років на полях нашого підприємства. Урожайність цього року становила 10 т, вологість — 13% на площі 400 га. Високоврожайний та пластичний гібрид, стійкий до вилягання і хвороб, посухостійкий. менеджер компанії «Байер» Худяков О. є для нас досвідченим та кваліфікованим спеціалістом, який добре вміє донести цінність продукту і розкрити його можливості.



ДКС 3939


ФАО 320

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Посухостійкість
- Високий потенціал урожайності
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–65 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–75 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**


Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 3939



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.

Риженко Анатолій Сергійович,
головний агроном, ФГ «Вітчизна-Тиниця»,
Чернігівська обл., Ніжинський р-н



Наше господарство зацікавлене в дослідженні нових гібридів, тож кожного року ми висіваємо демопосіви та аналізуємо отриману врожайність. Саме гібриди компанії «Байер» займають лідерські позиції за врожайністю. У сівозміні господарства — кукурудза на зерно. Попередником часто є цукрові буряки. За нашими внутрішніми дослідженнями, ДКС 3939 на перших етапах росту і розвитку краще адаптується та розвивається в таких умовах, що, відповідно, відображається на його врожайності. Нам подобається, що кожного року ДКС 3939 має найкращу натуру зерна, і це позитивно впливає на логістичні витрати. Завдяки тому, що качан є фіксованим, ми маємо змогу коригувати густоту залежно від типу ґрунту та умов, які склалися на період сівби.



ДКС 4109

ФАО 320

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Посухостійкість
- Високий потенціал урожайності
- Холодостійкість

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача

6 7 8 **9**

Посухостійкість

6 7 **8** 9

Початкова
енергія росту

6 7 **8** 9

Стабільність
та пластичність

6 7 **8** 9

Стійкість до фузаріозу
стебла/качана

6 7 8 **9**

Холодостійкість

6 7 **8** 9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**

Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **достатнього
та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **придатний
до вирощування на суглинкових
та глинистих ґрунтах**

Рівень мінерального живлення:
середній і високий

Рекомендований основний
обробіток ґрунту: **традиційний**

Температура ґрунту в період
посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестояю:
витримує тривалий перестій

**Гібрид рекомендовано
для зернового використання**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4109



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Годунок Юрій Олексійович,
головний агроном, СТОВ «Аратта»,
Київська обл., Броварський р-н



Гібрид ДКС 4109 висівали на демонстраційному посіві. Загальна площа у господарстві під кукурудзою — 3000 га. До системи живлення входили карбамід (200 кг) та НПК (80 кг), які вносили під час сівби. Основний обробіток ґрунту проводили традиційний. Температура ґрунту під час сівби становила 9°C. Гібрид проявив чудову стійкість до монокультури і тривалого періоду перестою. Урожайність на демоділянці була на рівні 152 ц/га за вологості 19%.



ДКС 4125


ФАО 330

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стабільність та пластичність в усіх зонах вирощування
- Висока посухостійкість
- Адаптивність до різних систем обробітку ґрунту і живлення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–65 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів, за винятком піщаних

Рівень мінерального живлення:
середній, високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестояю:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендовано для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4125



■ Показники сезону 2024 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Курінний Микола Сергійович,
головний агроном, ПП «Імені Калашника»,
Полтавська обл., Полтавський р-н



Господарство ПП «Імені Калашника» має досить тривалу позитивну історію взаємовідносин із компанією «Байер». Із гібридами селекції DEKALB® «знайомі» понад 15 років. Господарство вирощує 1200 га кукурудзи на зерно. 80% гібридів на наших полях — селекція DEKALB®. Щорічно ми закладаємо демоділянки для пошуку високоврожайних гібридів кукурудзи для наших складних кліматичних умов. Минулого сезону на наших полях з'явився ДКС 4125, він був лідером на демоділянках та не гірші результати показав і в товарних посівах. Має високу рядність (18–20 рядів), утім, основне чим приваблює цей гібрид — це висока маса тисячі насінин.



ДКС 4433

ФАО 340

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньостигла**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал продуктивності в зонах достатнього і нестійкого зволоження
- Сильна коренева система та міцне стебло
- Адаптивність до різних рівнів мінерального живлення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **55 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **зона достатнього та нестійкого зволоження**

Відношення до ґрунтів: **для всіх типів ґрунтів, за винятком важких суглинків**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, Strip-till, No-tillage**

Температура ґрунту в період сівби: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендовано для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4433



■ Показники сезону 2024 р.

■ Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Артем Погосян,
менеджер зі збуту в Полтавській області,
компанія «Байєр»



Гібрид ДКС 4433 має високий потенціал продуктивності у своїй групі стиглості та рекомендований для вирощування в зонах достатнього і нестійкого зволоження. Сильна коренева система та стебло в поєднанні зі стійкістю до хвороб забезпечують можливість вирощування гібрида за будь-яких систем обробітку ґрунту та в монокультурі. Гібрид добре адаптований до різних рівнів мінерального живлення, формує велику рядність (18–20) і має важке натурне зерно, що створює передумови стабільно високої врожайності.



ДКС 4391 FS


ФАО 350

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Міцне стебло та коренева система
- Висока енергія стартового росту

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **65 000–70 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **75 000–80 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**


Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**

Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4391 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Антоновський Олександр Володимирович,
головний агроном, ТОВ «Прогрес»,
Чернігівська обл., Прилуцький р-н



Наше господарство співпрацює з компанією «Байєр» уже багато років. У гібридах DEKALB® нам подобається стабільність отримання високого врожаю в наших умовах.

Останні кілька років ми стикаємося з посухою, а на ранніх етапах розвитку — з похолоданням та приморозками. Гібрид ДКС 4391 цього року ми взяли на заміну ДКС 4351, і бачимо відмінну холодостійкість на початкових етапах росту, відмітили високий потенціал урожаю — понад 12 т/га. Також гарно себе показують інші гібриди, які ми висіваємо з ФАО 280–350.



ДКС 4598 FS

ФАО 360

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожайності
- Придатність до вирощування у різних умовах
- Стійкість до хвороб стебла та качана

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посухостійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–60 000, на зрошенні — 85 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній, високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестою: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4598 FS



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.


Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Александрович Микола Юрійович,
головний агроном, ПСП «Україна»,
Житомирська обл., Житомирський р-н

Вибір насіння кукурудзи для господарства є принциповим, це має бути стабільний та високопродуктивний гібрид із пластичними характеристиками для різних умов вирощування і різних типів ґрунтів. Тому наш вибір впав, зокрема й на ДКС 4598. У цей надзвичайно складний рік гібрид показав хорошу початкову енергію росту, зважаючи на холодний червень — надзвичайну холодостійкість, сформував гарне потужне стебло, що позиціонує його як стійкого до вилягання, у результаті чого дає впевненість у зміщенні його до більш пізніх строків збирання, також формує високий потенціал урожайності в складних умовах. Урожайність сезону 2025 — на рівні 150 ц/га в перерахунку на базову вологість. Ураховуючи це, плануємо і надалі вирощувати його в структурі наших посівів.



ДКС 4712

ФАО 370

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Адаптивність і пластичність
- Міцні стебло та коренева система
- Толерантність до загущення

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посухостійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **70 000–75 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 8°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4712



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.

Полонський Іван Петрович,
голова господарства, ФГ «Теолінське»,
Черкаська обл., Уманський р-н



Основні площі під посівом кукурудзи в ФГ «Теолінське» займають гібриди DEKALB®, зокрема ДКС 4712, що зарекомендував себе як досить потужний гібрид, який придатний для вирощування на різних типах ґрунтів. Має високий потенціал урожайності та швидку вологовіддачу. У 2024 році був висіяний із нормою 63 тис./га на площі 120 га та мав урожайність на рівні 100 ц/га з вологістю 15%.

Гібрид відзначився міцною кореневою системою і потужним стеблом. Він проявив стабільність як у сприятливих, так і в стресових погодних умовах. Цілком задоволений вибором на користь генетики DEKALB®.



ДКС 4897

ФАО 380

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **середньопізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Здорове і міцне стебло та сильна коренева система
- Висока стійкість проти хвороб стебла й качана
- Гібрид закладає велику кількість рядів зерен (20–22)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вологовіддача	6	7	8	9
Посуhostійкість	6	7	8	9
Початкова енергія росту	6	7	8	9
Стабільність та пластичність	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу стебла/качана	6	7	8	9
Холодостійкість	6	7	8	9

ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000, на зрошенні — 80 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів:
для всіх типів ґрунтів, за винятком піщаних

Рівень мінерального живлення:
високий

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури:
витримує монокультуру


Відношення до перестояю:
витримує тривалий перестій

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 4897



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку
на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %.

Дані з демопосівів.



Жуковський Василь Романович,
головний агроном, ТОВ «УІФК-Агро»,
Київська обл., Броварський р-н

ДКС 4897 цього року був посіяний на площі 177 га. Середня врожайність становила 110 ц/га. Незважаючи на те, що гібрид має ФАО 380, потреби в сушінні не виникло. Вологість з поля становила 13,5–15%.



ДКС 5075 FS


ФАО 410

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **пізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Стабільність у всіх біозонах
- Посухостійкість
- Міцне стебло та коренева система

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000, на зрошенні — 85 000–90 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **55 000–60 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів (піщані — за умови достатнього зволоження)**

Рівень мінерального живлення: **середній і високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний, No-tillage**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 5075 FS



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість під час збирання, %.
Дані з демопосівів.

Ткачук Сергій Леонідович,
керівник господарства, ФГ «Анона»,
Київська обл., Білоцерківський р-н



Господарство спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур за технологією Strip-till. Для ефективного застосування цієї технології потрібні гібриди кукурудзи з потужною кореневою системою та сильним стеблом, такі як ДКС 3972, ДКС 4598 та ДКС 5075 FS. Гібрид ДКС 5075 FS вирощуємо з 2021 року. Особливість зерна цього гібрида в тому, що воно зберігає свою цілісність навіть у разі багаторазового перевантаження, сушіння й транспортування. У 2023 році за системи живлення 50 кг/га аміачної селітри під час сіви та 130 л/га КАС 32 у підживлення гібрид ДКС 5075 FS забезпечив урожайність на рівні 12,7 т/га зі збиральною вологістю зерна 21%, що є хорошим показником для групи стиглості ФАО 410.



ДКС 5206

ФАО 420

Тип зерна: **зубовидний**
Група стиглості: **пізня**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал врожайності
- Стійкість до хвороб стебла та качана
- Міцне стебло

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

Посушливі умови: **50 000–55 000, на зрошенні — 85 000–95 000 шт./га**
Умови нестійкого зволоження: **60 000–65 000 шт./га**
Умови достатнього зволоження: **65 000–70 000 шт./га**

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІБРИДА

Зона вирощування: **усі зони**

Відношення до ґрунтів: **придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів**

Рівень мінерального живлення: **високий**

Рекомендований основний обробіток ґрунту: **традиційний, мінімальний**

Температура ґрунту в період посіву: **від 9°C**

Відношення до монокультури: **витримує монокультуру**


Відношення до перестоя: **витримує тривалий перестій**

Гібрид рекомендований для зернового та силосного використання. Можливе вирощування на зрошенні



Скануйте QR-код.
Більше про
наш гібрид тут

Результати урожайності ДКС 5206



- Показники сезону 2024 р.
- Показники сезону 2023 р.
- Показники сезону 2022 р.

Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.

Вологість під час збирання, %. Дані з демопосівів.



Христюк Володимир Дмитрович,
головний агроном господарства, СТОВ «Маяк»,
Вінницька обл., Хмільницький р-н

Навесні 2024 року ми вирішили розвиватися в тваринництві, а саме — збільшувати кількість ВРХ для виробництва молока. Для нас важливо обрати надійного партнера — виробника кукурудзи. Наші вимоги були такими: гібрид має бути універсальним, придатним як на зерно, так і на силос. Після випробувань гібридів на полі зупинили свій вибір на DEKALB®, зокрема — ДКС 5206. Гібрид добре проявив себе в полі: він є пластичним до умов вирощування, а цьогорічна спека була справжнім випробуванням. Збирали гібрид і на зерно, і на силос. Урожайність ДКС 5206 — 138,8 ц/га, вологість під час збирання — 18,6%. Ділянка випробування під силос дала 580 ц/га, якістю задоволені. Норма висіву на силос була 85 тис., на зерно — 73 тис. шт./га. Надійність та високий потенціал DEKALB® підтвердив і на наших полях. Дякую представнику та компанії «Байер» за професійний супровід і рекомендовані гібриди.

РІШЕННЯ ACCELERON® SEED APPLIED SOLUTIONS

Ефективна комбінація біологічних препаратів та засобів захисту рослин з гібридами DEKALB®

ЙОАЛО®

Біологічний продукт — розвиток кореневої системи — підвищення потенціалу врожайності!







РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОТРУЮВАННЯ ACCELERON®, ЩО ПОСИЛЮЮТЬ ПОТЕНЦІАЛ НАСІННЯ DEKALB®

Гібриди DEKALB® довели свою ефективність на полях українських аграріїв. Це стало можливим завдяки надійному захисту гібридів від таких загроз, як хвороби та пошкодження шкідниками на початкових стадіях розвитку, й поліпшенню розвитку кореневої системи.

Протруювання насіння Acceleron® захищає рослини протягом перших 30 днів і далі, що дає змогу підвищити стійкість рослин на початку сезону, забезпечити рівномірність розвитку та покращити енергію початкового росту. Тому, висіваючи гібрид DEKALB®, оброблений Acceleron® Seed Applied Solutions, можна бути впевненим у найвищій якості насіння та очікувати на розкриття повного потенціалу гібрида.

ЗАХИСТ ТА МАКСИМАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД САМОГО ПОЧАТКУ



Плівкове покриття насіння

поліпшує сипкість, захищає фунгіцид,
інсектицид та біостимулятор від стирання



Біостимулятор

значно збільшує функціональний об'єм кореневої системи, що дає змогу рослинам покращити поглинання поживних речовин та вологи



Фунгіцид



Інсектицид

захист від хвороб та шкідників на початку сезону — поліпшує стійкість рослин, забезпечує потужний старт

ВИБЕРІТЬ НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ ВАШИХ ПОТРЕБ

acceleron®
elite

Фунгіцид



Біостимулятор



Інсектицид



МАКСИМІЗУЙТЕ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ ЗАВДЯКИ БІОСТИМУЛЮВАННЮ

1 ПЕРЕДСИМБІОТИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ

ЛХО

2 НАЛАГОДЖЕННЯ МІКОРИЗНОГО СИМБІОЗУ

3 БІЛЬШИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ КОРЕНЯ

• ВОДА
• МІКРОНУТРИЄНТИ

В-360 містить молекулу ЛХО (ліпо-хітоолігосахарид), яка є центральним учасником симбіотичної взаємодії між коренями рослин та мікоризним міцелієм. В-360 діє двома способами:

- Надсилає сигнал рослині про відкриття клітин коренів для мікоризних грибів
- Сприяє проростанню спор мікоризних грибів та пришвидшує утворення гіфів

У результаті відбувається проростання мікоризи та утворення симбіотичних зв'язків із коренями.

Функціональний об'єм кореня (коренева система рослини + мікориза) збільшується, а отже, рослина має доступ до більшої ґрунтової зони та до поживних речовин і води, які раніше були недоступними.



- Заселяє коріння і розчиняє недоступні, зв'язані в ґрунті, поживні речовини
- Зокрема, переводить у доступну форму як органічні, так і неорганічні мінеральні сполуки, що контактують із корінням





БЕЗ ОБРОБКИ

Число коренів — 47
Довжина коренів — 566 см
Загальна вага коренів — 9,6 г

Йоало

Число зародкових коренів — 52
Довжина коренів — 732 см
Загальна вага коренів — 13,2 г



Біологічний продукт (*Bacillus velezensis*)



Збільшення кореневої системи



Підвищення потенціалу врожайності

 **acceleron**[®]

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ



ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ

 Гербіциди  Інсектициди  Протруйники  Фунгіциди  Регулятори росту	1 Фомопсис, фомоз, склеротиніоз, альтернаріоз, ботритіс, іржа, септоріоз	2 Фомопсис, фомоз, склеротиніоз, альтернаріоз, ботритіс, іржа, септоріоз	ПРОПУЛЬС 0,8–1,0 л/га (в т.ч. авіаметодом)	ПРОПУЛЬС 0,8–1,0 л/га (в т.ч. авіаметодом)	ФОКС 0,6–0,8 л/га	ФОКС 0,6–0,8 л/га	Раймалт ПЛАУЕР 1,5 кг/га Раймалт ЕКСГРА 2,4 л/га Раймалт МАКС 2,4 л/га (вологість насіння 20–25%)	Церон 0,75–1,0 л/га	БЕЛТ 0,1–0,15 л/га	БЕЛТ 0,1–0,15 л/га ДЕКІС 0,1–0,15 л/га КОНТЕКТ 0,5–0,6 л/га оберон 0,7–0,8 л/га Еваго 0,12*–0,3 л/га	Альєт 1,5–2,0 кг/га	Челендж 2,5 л/га + Харнес 1,5 л/га Меро 1,0 л/га	Челендж 1,0–2,0 л/га + Меро 1,0 л/га	Челендж 1,0–2,0 л/га + Меро 1,0 л/га	Челендж 1,0–2,0 л/га + Меро 1,0 л/га	ВВСН 00 проростання сім'ядольні листки	10 2–4 спр. листки	12 8 спр. листків	18 11 спр. листків поч. видоуження пагона	31 поч. відокремлення зірочки від листків	51 середина цвітіння	65 поч. побуріння кошика
---	---	---	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---	---	---	--	-------------------------------	------------------------------	--	--	---------------------------------	-------------------------------------

* — Детальну інформацію щодо змін норм застосування препарату Вайєго® наведено на сторінці 66 каталогу ЗЗР.

ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ



Гербіциди




Інсектициди



Протруйники



Фунгіциди



* — Детальну інформацію щодо змін норм застосування препарату Вайєго® наведено на сторінці 66 каталогу ЗЗР.

** — В процесі реєстрації.

*** — Актуальну інформацію про зміни норм використання Аденго® наведено на сторінці 6 каталогу ЗЗР.

**** — Оновлені рекомендації щодо норм внесення Мерлін® Флекс Дуо розміщені на сторінці 37 каталогу ЗЗР.

CLIMATE FIELDVIEW™

перетворює
величезний обсяг
даних на ефективні
поради








МАКСИМІЗУЙТЕ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ З ІНСТРУМЕНТАМИ CLIMATE FIELDVIEW™

Аналіз урожайності є одним із найважливіших процесів для прийняття рішення у виробництві сільськогосподарських культур.

Інструмент аналізу урожайності в FieldView™ пропонує аналіз продуктивності за гібридами, типами ґрунтів або за зонами вирощування. За допомогою цього інструменту можна виміряти вплив агрономічних рішень на урожайність на кожному полі та на кожній зоні поля. FieldView™ надає перелік гібридів, що вирощуються в господарстві, з оглядом результатів



їх урожайності та інших параметрів за останні кілька сезонів. Інформація та висновки, отримані в результаті аналізу урожайності, є найкориснішими даними для вибору гібридів та технології вирощування. Розглянувши, як різні гібриди показали себе з різними нормами висіву, легко зробити наступний крок, створивши карту-завдання з диференційованими нормами висіву за допомогою вдосконаленого інструменту FieldView™ Seed Scripts.



3

Звіти

Аналіз урожайності для 2024 Кукурудза За Гібрид

Короткий огляд

9 958,30 Вага з поля (т)

18,9% Вологість

9 546,51 Врожайність (т)

DKC

	Площа, з якої зібрано врожай (га)	Вологість	Середня врожайність (т/га) ↓
У середн.: 14,13			
DKC 4712	9,9	18,8%	15,63
DKC3972 DEKALB	342,0	19,4%	14,08

В аналіз не включено гібриди, врожай яких був менше 0,04 гектара.

2 Гібриди	351,9 га	18,9%	14,13 т/га
-----------	----------	-------	------------

Головна сторінка Поля Карти завдань Звіти Налаштування Field View Cab



ГУСТОТА ПОСІВУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН



FieldView™ допомагає відстежувати продуктивність вашого гібрида. А для густоти рослин є функція, яка допоможе максимально використати кожен квадратний метр вашого поля — FieldView™ Seed Script.

FieldView™ Seed Script поєднує дані з вашого поля з аналітичними даними та результатами ретельних випробувань густоти посіву, проведених нашими вченими з DEKALB®. Мета — надзвичайно точні й індивідуальні норми висіву, локалізовані під умови вашого поля за лічені хвилини.

З оптимізованою густотою рослин і гібридами DEKALB® ви досягаєте максимального потенціалу врожайності.



Введіть сівозміну
попередніх років, ваш
цільовий гібрид
і очікуваний вихід
сухої маси, вартість
мішка та ціну
кукурудзи. FieldView™
Seed Script зробить
все інше за вас.



Щоб отримати результати зі змінною
нормою висіву (ЗНВ), смуги, висіяні з
фіксованою нормою, є обов'язковими.
І що відбувається потім? У FieldView™
ви можете навіть проводити аналіз
урожайності — смуга за смугою.



Рекомендації щодо густоти надають
лише для гібридів, підтверджених
роками польових випробувань.
Зверніться до свого представника
«Байер», аби отримати поради
щодо інших гібридів.

РЕГІОНАЛЬНА КОМАНДА



СОНЯШНИК



КУКУРУДЗА



ACCELERON®



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ



CLIMATE FIELDVIEW™



КОМАНДА

Зміст

Команда регіональних продажів:

Північний регіон	124
Центральний регіон	125
Південний регіон	126
Західний регіон	127
Північно-західний регіон	128
Східний регіон	128

Команда по роботі з агрохолдингами:

Правобережної України	129
Лівобережної України	130

Команда регіональних продажів

Північний регіон



**БОЖКО
ОЛЕКСІЙ**

Полтавська область
050 356 42 53



**БОЙКО
АНАТОЛІЙ**

Полтавська область
050 356 68 86



**БУРИЙ
ЄВГЕН**

Полтавська область
050 339 56 40



**ВАНЖУЛА
ДМИТРО**

Полтавська область
050 480 34 74



**ГУЗЬОМА
ВАДИМ**

Полтавська область
095 282 90 44



**ПОГОСЯН
АРТЕМ**

Полтавська область
050 380 58 84



**БУДЬОННИЙ
СЕРГІЙ**

Сумська область
050 511 31 08



**СТОРОЖЕВ
СЕРГІЙ**

Сумська область
050 444 19 52



**ЗАВОДЕНКО
МИХАЙЛО**

Чернігівська область
095 288 68 13



**ПОЛОЗ
В'ЯЧЕСЛАВ**

Чернігівська область
050 413 01 65



**САВЧЕНКО
АНДРІЙ**

Чернігівська область
050 410 80 76



Актуальна
інформація тут

Команда регіональних продажів

Центральний регіон



**БАНДРОВСЬКИЙ
ДМИТРО**

Вінницька область
095 272 56 47



**ЛЮБЧИЧ
СЕРГІЙ**

Вінницька область
050 424 75 16



**ОСАДЧИЙ
АРТЕМ**

Вінницька область
066 118 91 77



**ОХОТА
ДМИТРО**

Вінницька область
050 327 58 42



**ФУРСА
ВОЛОДИМИР**

Вінницька область
095 272 46 00



**ВРУБЛЕВСЬКИЙ
АНДРІЙ**

Київська область
050 351 67 03



**ГАНДЗИЧ
ОЛЕКСАНДР**

Київська область
050 374 36 45



**КІРІЧЕК
АНТОН**

Київська область
095 273 71 31



**САЧОК
РОМАН**

Київська область
050 454 27 99



**ХУДЯКОВ
ОЛЕКСАНДР**

Київська область
050 410 58 87



**БЕРЕЗА
ІГОР**

Черкаська область
050 443 72 79



**ГРИГОРАШ
АНДРІЙ**

Черкаська область
066 860 07 36



**КАЛАНТИР
ВЯЧЕСЛАВ**

Черкаська область
050 352 93 88



**КОНАКБАЄВ
ВІТАЛІЙ**

Черкаська область
095 285 27 71



**КРИВЕНКО
СЕРГІЙ**

ЗЗР (СПЕЦКУЛЬТУРИ)
Вінницька, Київська та
Черкаська області
050 438 04 25



Актуальна
інформація тут

Команда регіональних продажів

Південний регіон



**ЗАБЛОЦЬКА
РУСЛАНА**

Кіровоградська область
050 465 16 03



**КРАВЦАН
АНДРІЙ**

Кіровоградська область
095 218 67 25



**ПОСТОРОНКО
ВІКТОР**

Кіровоградська область
050 445 11 27



**ЯНОВСЬКИЙ
РОМАН**

Кіровоградська область
050 470 34 50



**АРТЮХ
АНДРІЙ**

Миколаївська область
095 273 43 88



**МАНЯК
ОЛЕГ**

Миколаївська область
050 435 82 84



**МАТВІЙЧУК
ЮРІЙ**

Одеська область
050 469 35 13



**ЧЕБАН
СЕРГІЙ**

Одеська область
095 286 19 15



**ЧИКАНЧИ
ДМИТРО**

Одеська область
050 422 80 77



Актуальна
інформація тут

Команда регіональних продажів

Західний регіон



**ВІННІЧУК
НАЗАРІЙ**

Тернопільська область
050 463 57 40



**ГРАБ
ОЛЕКСАНДР**

Тернопільська область
050 447 17 92



**ПЕТРОСЮК
ДЕНИС**

Тернопільська область
050 313 49 05



**ЧУБАРИК
ВОЛОДИМИР**

Тернопільська область
050 448 08 71



**ГУТ
БОГДАН**

Хмельницька область
099 340 04 25



**ДОЦЕНКО
ВАДИМ**

Хмельницька область
050 421 23 57



**ОЛІЙНИК
ОЛЕКСАНДР**

Хмельницька область
095 272 66 18



**СОКОЛАН
НАЗАР**

Чернівецька та Івано-
Франківська області
050 190 01 68



**МАСЮК
ВОЛОДИМИР**

Івано-Франківська та
Закарпатська області
050 417 39 52

Актуальна
інформація тут



Команда регіональних продажів

Східний регіон



**ХАРЧЕНКО
РОМАН**

Дніпропетровська та
Запорізька області
050 352 96 13



**РУДАС
ВІТАЛІЙ**

Дніпропетровська,
Херсонська та
Донецька області
095 282 26 97



**КОВАЛЕНКО
ОЛЕКСІЙ**

Дніпропетровська
область
095 285 87 60



**ПАСІЧНИК
ВІКТОР**

Харківська область
050 422 16 70

Команда регіональних продажів

Північно-західний регіон



**ТАРАСІУК
ІВАН**

Волинська та
Рівненська області
050 356 27 89



**АТАМАНЮК
АНАТОЛІЙ**

Рівненська область
050 413 08 95



**КОВБ
АНДРІЙ**

Житомирська область
050 550 10 23



**ЩЕРБЛЮК
ОЛЕГ**

Житомирська область
050 334 24 32



**МІЗЕРНИК
ДМИТРО**

Львівська область
050 337 23 99



**ШЕВЧУК
ІВАН**

Львівська та
Волинська області
075 191 44 61



Актуальна
інформація тут

Команда по роботі з агрохолдингами

Правобережної України



**СТЕПАНЧУК
ОЛЕКСІЙ**

Вінницька область
050 332 55 95



**БАЛИЦЬКИЙ
ЯРОСЛАВ**

Тернопільська,
Рівненська, Волинська
та Львівська області
095 288 67 20



**ПІНЧУК
ВАСИЛЬ**

Івано-Франківська,
Закарпатська та
Чернівецька області
050 355 39 64



**КОСТЕНКО
ОЛЕКСАНДР**

Київська область
095 286 19 16



**ДАНИЛЕНКО
ВАСИЛЬ**

Київська та
Житомирська області
050 385 81 70



**БЕРНАДЗІКОВСЬКИЙ
СЕРГІЙ**

Хмельницька область
050 387 32 07



**ГОЙСЮК
ЮРІЙ**

Хмельницька область
050 413 87 15



Актуальна
інформація тут

Команда по роботі з агрохолдингами

Лівобережної України



**КУЛИНИЧ
ВОЛОДИМИР**

Полтавська,
Дніпропетровська та
Харківська області
050 415 83 40



**ПРИХОДЬКО
ДМИТРО**

Черкаська, Кіровоград-
ська, Одеська та Мико-
лаївська області
095 273 21 98



**БОЙКО
АНДРІЙ**

Чернігівська та
Сумська області
050 474 23 11



**ДУГІНА
ЯНА**

Чернігівська область
050 050 11 69



**ТАРАСЕНКО
ОЛЕКСАНДР**

Чернігівська та
Сумська області
095 380 96 91



Актуальна
інформація тут

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ «БАЙЄР»

«Байєр» в Україні, як і в усьому світі, послідовно виконує міжнародні правила безпеки застосування продуктів і дотримується високих стандартів якості своєї продукції. Одним із принципів безпечного використання продуктів є принцип повного циклу супроводження продуктів: від стадії закупівлі до постачання користувачеві. Програма безпечного застосування продуктів під маркою «Байєр» працює в усьому світі, в Україні — це кампанія, яка пропагує і втілює принцип безпеки продуктів для людини та навколишнього середовища.

Ось кілька основних правил персональної безпеки всіх користувачів продукції «Байєр»:

- Ніколи не їжте, не пийте і не паліть під час роботи з продуктами!
- Максимально слід захистити руки — рукавичками, а тіло — одягом!
- Після роботи треба ретельно вимити руки!
- В місці, де змішуєте розчин продукту, не повинні перебувати діти і домашні тварини!



Завжди потрібно уважно прочитати інформацію на етикетці перед використанням продукту

На всіх етикетках продуктів під маркою «Байєр» є докладний інструктаж із безпечного використання. Обов'язково прочитайте весь текст, навіть якщо вам здається, що ви щось подібне вже читали. Не слід вважати, що всі інструкції однакові. Якщо ви чогось не розумієте, порадьтеся з кимось, хто вже знайомий із такою інструкцією. Запам'ятайте всю попереджувальну інформацію щодо роботи з концентрованою формуляцією. Звертайте увагу на всі знаки безпеки, піктограми та додаткову інформацію на етикетці.



Одяг для роботи слід зберігати в окремому місці, його треба регулярно прати (окремо від повсякденного одягу) і тримати чистим

Під час приготування суміші завжди слід одягати одяг із довгими рукавами, довгі штани і міцне взуття. Найкращий одяг для роботи — бавовняний комбінезон. Ви повинні бути впевнені, що у вас є всі необхідні захисні засоби, такі як: окуляри або маска, респіратор, фартух, а також запасна пара рукавичок. Маску-респіратор потрібно одягати, якщо цього вимагає інструкція, наприклад, якщо під час роботи утворюється пил.



Рукавички слід одягати обов'язково перед роботою з препаратами

Вони мають бути виготовлені з цупкого матеріалу, довгими, до ліктя, і правильно дібраного розміру. Рукавички слід перевіряти перед роботою: мають бути цілими, без дірок. Вид рукавичок слід обирати відповідно до завдання (змішування/складування). Після роботи рукавички треба вимити, не знімаючи, а потім, знявши, вимити руки. Одягніть рукавички, якщо працюєте з обробленим насінням!



Контейнери з-під продуктів мають стояти в спеціально відведеному місці

Під час змішування суміші треба ставити контейнер і мірну тару на пласку поверхню. Наливати продукт слід охайно, без утворення бризок, щоб під час переливання у контейнер не потрапляло повітря. Відмірявши потрібну кількість продукту для суміші, відразу щільно закрити кришку. Використаний контейнер слід добре промити щонайменше три рази, а залишки суміші вилити в бак для змішування. Використані контейнери необхідно зберігати в окремому місці, а потім утилізувати.

УСПІШНОГО РОКУ, ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ!

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ТА БАКОВИХ СУМІШЕЙ

До відома споживачів! Фізична сумісність препаратів у бакових сумішах не може гарантувати відсутність негативного впливу окремих компонентів на біологічну ефективність препаратів через антагонізм або прояву фітотоксичності на культурних рослинах. «Байер» не дає гарантії і не несе відповідальності стосовно сумісності препаратів. Приготування бакових сумішей та їх використання покладається на власний ризик оператора-споживача!

Основні правила приготування бакових сумішей:

Кожний препарат бакової суміші застосовують відповідно до вимог зазначених на тарній етикетці. Якщо немає будь-яких застережень щодо несумісності окремих бакових партнерів, необхідно провести додатково тест на сумісність.

Не використовуйте більше ніж 3 препарати в баковій суміші за повних норм витрат. Що більше бакових партнерів вноситься за повних норм витрат, то менша їх кількість має бути в баковій суміші.

Не допускається зниження рекомендованих норм витрат води в бакових сумішах. Інакше значно підвищуються ризики несумісності (особливо за використання висококонцентрованих розчинів) та фітотоксичності.

Окремі типи препаративних форм значно підвищують ризики фітотоксичності за їх використання в бакових сумішах, зокрема такими можуть виступати концентрати емульсій.

Перед приготуванням робочого розчину переконайтеся у використанні води, що відповідає рекомендованим рН показникам.

Не рекомендовано додавати прилипачі, якщо вони не передбачені виробником одного з бакових партнерів.

Для кращого змішування бакових партнерів під час приготування бакових сумішей рекомендовано дотримуватись наступної схеми:

Першочергово змішують тверді препаративні форми: порошок, що змочується (WP); гранули, що диспергуються у воді (WG); водорозчинні гранули (SG). Потім — концентрат суспензії (SC). Тоді — концентрат емульсії (EC); емульсія, олія у воді (EW); розчинний концентрат (SL); олійна дисперсія (OD). Після додають інші олійні розчини, добавки, добрива та мікродобрива.

Кожний препарат має бути повністю розчинений у баковій суміші перед додаванням наступного. Приготовану бакову суміш необхідно відразу використати. Переконайтеся в безперервному перемішуванні робочого розчину в резервуарі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Будь ласка, завжди читайте інструкцію на етикетці перед використанням продуктів ТМ «Bayer» та інших засобів захисту рослин, які імпортуються ТОВ «БАЙЕР» в Україну (надалі — «Продукти»). Інформація та рекомендації, які містяться у цьому виданні, ґрунтуються на рекомендаціях, інструкціях із застосування та дослідженнях щодо безпеки використання Продуктів. Усі Продукти ТМ «Bayer», що імпортуються в Україну єдиним офіційним імпортером ТОВ «Байер», є якісними, пройшли державну реєстрацію та відповідають Сертифікату складу препаративної форми, наданому Органам Державної реєстрації засобів захисту рослин в Україні.

Вся інформація та дані, використані під час створення цього видання, базуються на власних розробках та дослідженнях ТОВ «Байер», підтверджених акредитованими профільними державними установами і лабораторіями та є власністю ТОВ «Байер» та/або групи компаній Bayer та не можуть бути використані у комерційних цілях без дозволу правовласника.

Ефективність та безпека застосування препарату гарантується виробником лише за умови чіткого слідування інструкції та дозування препарату, зазначеного у виданні, а також за умови дотримання правил безпечного використання Продуктів.

Наведені норми і рекомендації із застосування розраховані за умови дотримання оптимальних параметрів елементів технології вирощування культури, зазначених на етикетці. У разі будь-яких відхилень від них (наприклад, складні погодні умови, запізнення з обробкою гербіцидом та ін.) або нестандартних ситуацій слід звернутися за консультацією до регіонального представника ТОВ «Байер». Перевіряйте наявність реєстрації в офіційних представників компанії та в офіційних документах (свідоцтвах про реєстрацію), які можна знайти на сайті www.cropscience.bayer.ua (надалі — «Сайт»).

У разі порушення норм та інструкцій, виробник й імпортер не несе відповідальності, окрім прямо передбаченої чинним законодавством України, за завдані збитки або втрати, які можуть виникнути в результаті невиконання зазначених вище рекомендацій та інструкцій із використання, застосування Продуктів на культурах/рослинах, що не пройшли випробування та які не включено до сертифікату про державну реєстрацію в Україні.

Але звертаємо вашу увагу на те, що рекомендації щодо застосування можуть різнитись, оскільки можуть залежати від низки інших факторів, включаючи, але не обмежуючись: кліматичні, географічні або біологічні особливості та/або розвинену стійкість рослин, сорт насіння, особливості ґрунту, води та інші чинники, що перебувають поза контролем ТОВ «Байер».

Тому у вас є можливість отримати діючим додаткову інформацію щодо Продукту в довідкових матеріалах ТОВ «Байер», на офіційному Сайті, а також звернувшись безпосередньо до консультантів ТОВ «Байер» у вашому регіоні.

Усі об'єкти інтелектуальної власності, використані у виданні, є власністю ТОВ «Байер» та/або групи компаній Bayer, належним чином захищені та не можуть бути використані без прямого письмового дозволу правовласника.

www.cropscience.bayer.ua

НОВИНКА


ДОСТУП ДО ВСІХ РЕСУРСІВ «БАЙЕР» ЗА ОДИМ ПОСИЛАННЯМ



- // каталоги онлайн
- // актуальні програми та акції
- // мобільний додаток «Асистент агронома»
- // чат-бот «Bayer Агрономіка»
- // стикери
- // контакти регіональної команди

BAYERCSUA

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАШОГО YOUTUBE-КАНАЛУ!



- // навчальні майстер-класи
- // поради фахівців
- // пізнавальні лекції
- // корисні відео

FACEBOOK-СТОРІНКА АГРОНОМІКА УКРАЇНА



На цій сторінці ми надаємо інформацію про свої продукти, діяльність та інновації в галузі сільського господарства, новини, наукові дослідження та корисні поради

INSTAGRAM-СТОРІНКА AGRONOMICA.BAYER



- // корисна та пізнавальна інформація для аграріїв
- // новинки в галузі засобів захисту рослин і насіння
- // поради від провідних експертів «Байер»
- // акції, конкурси та багато іншого

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «АСИСТЕНТ АГРОНОМА»



Мобільний додаток від «Байер» – це:

- // довідник насіння DEKALB®
- // детальний опис засобів захисту рослин
- // довідник шкідливих організмів
- // пошук рішення через культуру, тип препарату або шкідливі організми
- // понад 1000 фотографій та ілюстрацій
- // зручні фільтри і калькулятори


TIKTOK-СТОРІНКА AGRONOMICA.BAYER



- // рекомендації від фахівців
- // гумористичні відео аграрної тематики
- // демонстрація гібридів та дії препаратів

СТИКЕРИ

НОВИНКА



Яскраві й веселі Viber та Telegram-стикери для справжніх агрономів від «Байер»!

ЧАТ-БОТ BAYER «АГРОНОМІКА»



- // насіння DEKALB® та ЗЗР
- // новинки та каталоги
- // аналітика та ціни на зерно
- // актуальні поради щодо ситуацій у різних регіонах
- // вебсайти та мобільні додатки
- // онлайн-заходи